Page 1 of 2 2001166519 A



(11) Publication number:

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(51) Intl. Cl.: G03G 5/147 G03 (21) Application number: 11353343

G03G 5/07

(22) Application date: 13.12.99

(30) Priority:

(43) Date of

application 22.06.01

publication:

(84) Designated contracting states: (71) Applicant: CANON INC

(72) Inventor: SEKIYA MICHIYO

KIKUCHI NORIHI MARUYAMA AKIO AMAMIYA SHOJI **UEMATSU HIRONO**

200

TANAKA HIROYUK OCHI ATSUSHI

(74) Representative:

(54)

ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR, PROCESS CARTRIDGE AND ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electorphotographic photoreceptor which is good in sensitivity in spite of formation of a protective layer, is little in an increase of residual potential and small in potential fluctuation by environment at change and makes it possible obtain stable electrophotographic

2001166519 A Page 2 of 2

characteristics, a process cartridge having the electrophotographic photoreceptor and an electrophotographic device.

SOLUTION: The electrophotographic photoreceptor which has a conductive substrate, a photosensitive layer and a protective layer, has the protective layer containing a compound polymerized with a hole transferable component having ≥2 chain polymerizable functional groups within the same molecule and has the photosensitive layer containing a charge transfer material of ≥350 in molecular weight, the process cartridge having the electrophotographic photoreceptor and the electrophotographic device.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-166519 (P2001-166519A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(51) Int.Cl.'		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
G 0 3 G	5/147	502	G 0 3 G	5/147	502	2H068
	5/06	3 1 1		5/06	311	
	5/07	103		5/07	103	

審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全115頁)

(21)出願番号	特願平11-353343	(71)出願人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成11年12月13日(1999.12.13)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	関谷 道代
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	菊地 意裕
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	100065385
			弁理士 山下 積平
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置

(57)【要約】

【課題】 保護層を形成しても感度が良好であり、残留電位の上昇が少なく、環境変化による電位変動が小さく、安定した電子写真特性が得られる電子写真感光体、その電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置を提供することにある。

【解決手段】 導電性支持体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体において、該保護層が同一分子内に2つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重合した化合物を含有し、かつ該感光層が分子量350以上の電荷輸送材料を含有することを特徴とする電子写真感光体、その電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体において、該保護層が同一分子内に二つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重合した化合物を含有し、かつ該感光層が分子量350以上の電荷輸送材料を含有することを特徴とする電子写真感光体。

【請求項2】 前記感光層が分子量350以上700以下の電荷輸送材料を含有する請求項1に記載の電子写真 感光体。

【請求項3】 前記電荷輸送材料の割合が、前記感光層 が含有する全電荷輸送材料に対し50質量%以上である 請求項1又は2に記載の電子写真感光体。

【請求項4】 前記連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物が、下記一般式(1)である請求項1~3のいずれかに記載の電子写真感光体。

【化1】

$$(P^1)_a - A - \left(Z - (P^2)_d\right)_b \qquad (1)$$

(式中、Aは正孔輸送性基を示す。P¹及びP'は連鎖重 20 合性官能基を示す。P¹とP'は同一でも異なっても良い。Zは置換基を有しても良い有機基を示す。a、b及びdは0以上の整数を示し、a+b×dは2以上の整数を示す。また、aが2以上の場合P¹は同一でも異なってもよく、d が2以上の場合、Z及びP'は同一でも異なってもよい)

【請求項5】 上記一般式(1)のZが置換基を有してもよいアルキレン基、置換基を有してもよいアリーレン基、CR'=CR'(R'及びR'は置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基又は水素 30原子を示し、R'及びR'は同一でも異なっても良い)、C=O、S=O、SO2、酸素原子又は硫黄原子より一つあるいは任意に組み合わされた有機基を示す請求項4のいずれかに記載の電子写真感光体。

【請求項6】 上記一般式(1)のZが下記一般式(2)で示される請求項4 に記載の電子写真感光体。 【化2】

$$--\left(X^{1}\right)_{p}\left(Ar^{1}\right)_{q}\left(X^{2}\right)_{r}\left(Ar^{2}\right)_{s}\left(-X^{3}\right)_{t}$$

(式中、X¹~X³は置換基を有しても良いアルキレン基、(CR³=CR¹)。1、C=O、S=O、SO、酸素原子又は硫黄原子を示し、Ar¹~Ar²は置換基を有しても良いアリーレン基を示す。R³及びR¹は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアリール基又は水素原子を示し、R³及びR¹は同一でも異なっても良い。m¹は1~5の整数、p~tは0~10の整数を示す。但し、p~tは同時に0であることはない。)

【請求項7】 上記一般式(1)のZが下記一般式(3)で示される請求項4に記載の電子写真感光体。

$$\frac{(1.3)}{-(x^4)_{\alpha}(A^3)_{\gamma}(x^5)_{\alpha}}$$
 (3)

(式中、Ar³は置換基を有してもよいアリーレン基を示す。X³及びX³は(CH_2)。、(CH=CR³)。、 C=O、又は酸素原子を示す。R³は置換基を有してもよいアリール基又は 水素原子を示し、m³は $1\sim10$ の整数、m³は $1\sim5$ の 整数、 $u\sim$ wは $0\sim10$ の整数を示す。但し、 $u\sim$ wは 同時に0であることはない)

【請求項8】 同一分子内に二つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物の化合物の酸化電位が0.4~1.2(V)である請求項1~7のいずれかに記載の電子写真感光体。

【請求項9】 上記一般式(1)で、AとP'及びZとの結合部位を水素原子に置き換えた正孔輸送性化合物が下記一般式(4)で示される請求項4~8のいずれかに記載の電子写真感光体。

0 【化4】

$$\begin{array}{c}
R^6 \\
N \longrightarrow R^8 \\
R^7
\end{array} \tag{4}$$

(式中、R°、R'及びR'は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基又は置換基を有しても良いアリール基を示す。但し、少なくともそのうち2つはアリール基を示す。また、R°、R'及びR'はそれぞれ同一であっても異なっていてもよい)

【請求項10】 上記一般式(4)のR*、R'及びR* が置換基を有しても良いアリール基である請求項9に記載の電子写真感光体。

【請求項11】 上記一般式(1)で、AとP'及びZ との結合部位を水素原子に置き換えた正孔輸送性化合物 が下記一般式(5)で示される請求項4~8のいずれか に記載の電子写真感光体。

【化5】

$$R^{9}$$
 $N - Ar^{4} - Ar^{5} - N$ R^{11} R^{12} m^{4} (5)

(式中、R°~R''は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基又は置換基を有しても良いアリール基を示す。また、R'~R''はそれぞれ同一であっても異なっていてもよい。Ar'及びAr'は置換基を有しても良いアリーレン基を示し、それ50ぞれ同一でも異なっても良い。m'は0又は1を示す)

【請求項12】 上記一般式(5)のm'が1であり、 かつR'へR''が置換基を有しても良いアリール基であ る請求項11に記載の電子写真感光体。

【請求項13】 連鎖重合性官能基P¹、P¹の一方又は 両方が下記一般式(6)で示される不飽和重合性官能基 である請求項4~12のいずれかに記載の電子写真感光 体。

【化6】

$$(6)$$

(式中、Eは水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよいアルキル基及び置換基を有してもよいアリール基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシ基、-COOR¹³ (R¹³は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよ*

【請求項15】 連鎖重合性官能基P¹、P²の一方又は 両方が上記一般式(7)あるいは一般式(8)である請 30 求項14に記載の電子写真感光体。

【請求項16】 重合が電子線により行われる請求項1 ~15のいずれかに記載の電子写真感光体。

【請求項17】 電子線の加速電圧が250KV以下である請求項16に記載の電子写真感光体。

【請求項18】 電子線の線量が1~100Mradである請求項16又は17に記載の電子写真感光体。

【請求項19】 請求項1~18のいずれかに記載の電子写真感光体を、該電子写真感光体を帯電させる帯電手段、静電潜像の形成された電子写真感光体をトナーで現40像する現像手段、及び転写工程後の電子写真感光体上に残余するトナーを回収するクリーニング手段からなる群より選ばれた少なくとも一つの手段と共に一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカートリッジ。

【請求項20】 請求項1~18のいずれかに記載の電子写真感光体、該電子写真感光体を帯電させる帯電手段、帯電した電子写真感光体に対し露光を行い静電潜像を形成する露光手段、静電潜像の形成された電子写真感光体にトナーで現像する現像手段、及び電子写真感光体50

*いアルキル基、置換基を有してもよいアラルキル基又は 置換基を有してもよいアリール基)又は-CONR11R 11 {R11及びR11は水素原子、ハロゲン原子、置換基を 有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアラル キル基又は置換基を有してもよいアリール基を示し、互 いに同一であっても異なっていてもよい)を示し、♥は 置換基を有してもよいアリーレン基、置換基を有しても よいアルキレン基、一〇〇〇一、一〇H、一、一〇一、 -OO-、-S-又は-CONR16- {R16は水素原 10 子、ハロゲン原子、置換基を有してもよいアルキル基、 置換基を有してもよいアラルキル基又は置換基を有して もよいアリール基)を示す。fは0又は1を示す。) 【請求項14】 連鎖重合性官能基P1、P1の一方又は 両方が下記一般式(7)~一般式(13)の何れかであ る請求項4~12のいずれかに記載の電子写真感光体。 【化7】

上のトナー像を転写材上に転写する転写手段を備えるこ

【発明の詳細な説明】

(nは1 から3 の整数)

とを特徴とする電子写真装置。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置に関し、詳しくは、表面層に特定の化合物を含有し、かつ感光層に分子量350以上の電荷輸送材料を含有する電子写真感光体、その電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真感光体に、セレン、硫化カドミウム及び酸化亜鉛等の無機光導電性材料が広く用いられていた。一方、有機光導電性材料を用いた電子写真感光体としては、ボリーNービニルカリバゾールに代表される光導電性ボリマーや2、5ービス(pージエチルアミノフェニル)-1、3、4ーオキサジアゾールのような低分子の有機光導電性材料を用いたもの、更には、かかる有機光導電性材料と各種染料や顔料を組み合わせたもの等が知られている。

【0003】有機光導電性材料を用いた電子写真感光体 は成膜性が良く、塗工によって生産できるため、極めて 生産性が高く安価な電子写真感光体を提供できる利点を有している。また、使用する染料や顔料等の選択により、感光波長域を自在にコントロールできる等の利点を有し、これまで幅広い検討がなされてきた。特に最近では、有機光導電性染料や顔料を含有した電荷発生層と光導電性ポリマーや低分子の有機光導電性材料を含有した電荷輸送層を積層した機能分離型の電子写真感光体の開発により、従来の有機電子写真感光体の欠点とされていた感度や耐久性に著しい改善がなされてきており、これが有機電子写真感光体の主流となってきている。

【0004】一方、当然のことながら電子写真感光体には適用される電子写真プロセスに応じた感度、電気的特性、更には光学的特性を備えていることが要求される。特に、繰り返し使用される電子写真感光体にあっては、その電子写真感光体表面には帯電、画像露光、トナー現像、紙への転写、クリーニング処理といった電気的、機械的外力が直接加えられるため、それらに対する耐久性が要求される。具体的には、摺擦による表面の磨耗や傷の発生に対する耐久性、帯電による表面劣化が挙げられ、より詳しくは転写効率や滑り性の低下、更には感度 20低下、電位低下等の電気特性の劣化に対する耐久性も要求される。

【0005】一般に電子写真感光体の表面は薄い樹脂層であり、樹脂の特性が非常に重要である。上述の諸条件をある程度満足する樹脂として、近年、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等が実用化されているが、前述したような特性の全てがこれらの樹脂で満足されるわけではなく、特に電子写真感光体の高耐久化を図る上では該樹脂の被膜硬度は十分高いとは言い難い。これらの樹脂を表面層形成用の樹脂として用いた場合でも繰り返し使30用時において表面層の磨耗が起こり、更に傷が発生するという問題点があった。

【0006】更に、近年の有機電子写真感光体の高感度 化に対する要求から電荷輸送材料等の低分子量化合物が 比較的大量に添加される場合が多いが、この場合それら 低分子量材料の可塑剤的な作用により膜強度が著しく低 下し、一層繰り返し使用時の表面層の磨耗や傷発生が問 題となっている。また、電子写真感光体を長期にわたっ て保存する際に前述の低分子量成分が析出してしまい、 層分離するといった問題も発生している。

【0007】とれらの問題点を解決する手段として、硬化性の樹脂を電荷輸送層用の樹脂として用いる試みが、例えば特開平2-127652号公報等に開示されている。このように、電荷輸送層用の樹脂に硬化性の樹脂を用い電荷輸送層を硬化、架橋することによって機械的強度が増し、繰り返し使用時の耐削れ性及び耐傷性は大きく向上する。しかしながら硬化性樹脂を用いても、低分子量成分はあくまでも結着樹脂中において可塑剤として作用するので、先に述べたような析出や層分離の問題は根本的な解決にはなっていない。

【0008】また、有機電荷輸送材料と結着樹脂とで構成される電荷輸送層においては、電荷輸送能の樹脂に対する依存度が大きく、例えば硬度が十分に高い硬化性樹脂では電荷輸送能が十分ではなく繰り返し使用時に残留電位の上昇が見られる等、両者を満足させるまでには至っていない。

【0009】また、特開平5-216249号公報、特開平7-72640号公報等においては、電荷移動層に炭素-炭素二重結合を有するモノマーを含有させ、電荷10移動材の炭素-炭素二重結合と熱あるいは光のエネルギーによって反応させて電荷移動層硬化膜を形成した電子写真感光体が開示されているが、電荷輸送材はポリマー主骨格にベンダント状に固定化されているだけであり、先の可塑的な作用を十分に排除できないため機械的強度が十分ではない。また、電荷輸送能の向上のために電荷輸送材の濃度を高くすると、架橋密度が低くなり十分な機械的強度を確保することができない。更には、重合時に必要とされる開始剤類の電子写真特性への影響も懸念される。

【0010】また、別の解決手段として例えば特開平8-248649号公報等においては、熱可塑性高分子主鎖中に電荷輸送能を有する基を導入し電荷輸送層を形成させた電子写真感光体が開示されているが、従来の分子分散型の電荷輸送層と比較して析出や層分離に対しては効果があり、機械的強度も向上するが、あくまでも熱可塑性樹脂であり、その機械的強度には限界があり、樹脂の溶解性等を含めたハンドリングや生産性の面で十分であるとは言い難い。

【0011】以上述べたことを背景にして、本発明者ら

30 は、高い機械的強度と電荷輸送能の両立を達成するための検討を重ねた。その結果、同一分子内に二つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重合させた化合物を含有した電子写真感光体によって機械的強度と電荷輸送能の両立がほぼ達成されることが確認された。【0012】しかしながら、これを保護層として用いた場合においては、同一分子内に2つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を使用することで機械的強度は向上するが、感光層が有機系感光層である場合において感度が十分に得られなかったり、残留電位の上昇がみられることもあった。また、環境の変化に伴い電位が変動してしまい、安定した電位特性を得られないこと

【0013】近年の高画質化、高耐久化に伴い、より優れた電子写真感光体を提供するためにはこれらの問題をぜひ解決する必要があった。

[0014]

もあった。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、保護層を形成しても感度が良好であり、残留電位の上昇が少なく、環境変化による電位変動が小さく、安定した電子50 写真特性が得られる電子写真感光体を提供することにあ

る。

【0015】本発明の別の目的は、上記電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明に従って、導電性支持体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体において、該保護層が同一分子内に2つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重合した化合物を含有し、かつ該感光層が分子量350以上の電荷輸送材料を10含有するととを特徴とする電子写真感光体が提供される。

【0017】また本発明に従って、上記電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置が提供される。

[0018]

【発明の実施の形態】次に、本発明の電子写真感光体の 構成を詳細に説明する。

【0019】まず、本発明における保護層について説明する。はじめに、連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性 20 化合物について説明する。

【0020】本発明における連鎖重合とは、高分子物の生成反応を大きく連鎖重合と逐次重合に分けた場合の前者の重合反応形態を示し、詳しくは例えば技報堂出版三羽忠広著の「基礎 合成樹脂の化学(新版)」1995年7月25日(1版8刷)P.24に説明されているように、その形態が主にラジカルあるいはイオン等の中間体を経由して反応が進行する不飽和重合、開環重合そして異性化重合等のことをいう。前記一般式(1)における連鎖重合性官能基P¹及びP²とは、前述の反応形態が可能な官能基を意味するが、ここではその大半を占め応用範囲の広い不飽和重合あるいは開環重合性官能基の具体例を示す。

【0021】不飽和重合とは、ラジカル、イオン等によって不飽和基、例えばC=C、 $C\equiv C$ 、C=O、C=N、 $C\equiv N$ 等が重合する反応であるが、主にはC=Cである。不飽和重合性官能基の具体例を表1に示すがこれらに限定されるものではない。

[0022]

【表1】

表1:不飽和重合性官能基の具体例

【0023】表中、Rは置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有しても良いベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル基、置換基を有しても良いフェニル基、ナフチル基及びアンスリル基等のアリール基又は水素原子を示す。

【0024】開環重合とは、炭素環、オクソ環及び窒素 ヘテロ環等のひずみを有した不安定な環状構造が触媒の 作用で活性化され、開環すると同時に重合を繰り返し鎖 状高分子物を生成する反応であるが、この場合、基本的 40 にはイオンが活性種として作用するものが大部分である。開環重合性官能基の具体例を表2に示すがこれらに 限定されるものではない。

[0025]

【表2】

表 2. 開環重合性官能基の具体例

【0026】表中、Rは置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有しても良いベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のア 30 ラルキル基、置換基を有しても良いフェニル基、ナフチル基及びアンスリル基等のアリール基又は水素原子を示す。

【0027】上記で説明したような本発明に係わる連鎖 重合性官能基の中でも、下記の一般式(6)、(14) 及び(15)で示されるものが好ましい。

[0028]

[化8]

$$-\left(w\right)_{f}^{C} = CH_{2} \qquad (6)$$

【0029】式中、Eは水素原子、フッ素、塩素及び臭素等のハロゲン原子、置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有してもよいベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、ビレニル基、チオフェニル基及びフリル 基等のアリール基、メトキシ基、エトキシ基及びプロポ 50 0の整数を示す。

キシ基等のアルコキシ基、CN基、ニトロ基、-COOR¹¹又は-CONR¹¹R¹¹を示す。

【0030】Wは置換基を有しても良いフェニレン基、ナフチレン基及びアントラセニレン基等のアリーレン基、置換基を有しても良いメチレン基、エチレン基及びブチレン等のアルキレン基、-COO-、-CH,-、-O-、-OO-、-S-又は-CONR¹⁵-で示される

【0031】R¹¹、R¹¹、R¹¹及びR¹⁶は水素原子、フ n素、塩素、臭素及びヨウ素等のハロゲン原子、置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有してもよいベンジル基及びフェネチル基等のアラルキル基又は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基及びアンスリル基等のアリール基を示し、R¹¹とR¹¹は互いに同一であっても異なっても良い。また、fは0又は1を示す。

【0032】E及びW中で有してもよい置換基としては、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素等のハロゲン原子;ニトロ基、シアノ基、水酸基;メチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基;メトキシ基、エトキシ基及びプロポキシ基等のアルコキシ基;フェノキシ基及びナフトキシ基等のアリールオキシ基;ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル基;又はフェニル基、ナフチル基、アンスリル基及びピレニル基等のアリール基等が挙げられる。

[0033]

【化9】

【0034】式中、R¹⁷及びR¹⁸は水素原子、置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有してもよいベンジル基及びフェネチル基等のアラルキル基、又は置換基を有してもよいフェニル基及びナフチル基等のアリール基を示し、nは1~10の整数を示す。

[0035]

0 【化10】

$$(CH_2)_n^{19}$$
 (15)

式中、R¹⁹及びR¹⁰は水素原子、置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロピル及びブチル基等のアルキル基、置換基を有してもよいベンジル基及びフェネチル基等のアラルキル基、又は置換基を有してもよいフェニル基及びナフチル基等のアリール基を示し、nは0~10の整数を示す。

【0036】なお、上記一般式の(14)及び(15)のR¹⁷、R¹⁸、R¹⁸及びR¹⁸が有してもよい置換基としてはフッ素、塩素、臭素及びヨウ素等のハロゲン原子;メチル基、エチル基、プロピル基及びブチル基等のアルキル基;メトキシ基、エトキシ基及びプロポキシ基等のアリールオキシ基;ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル *

$$-0-C-C=CH_{2}$$
 (8)

【0039】更に、上記一般式(7)~一般式(13)の中でも、一般式(7)のアクリロイルオキシ基及び一般式(8)のメタクリロイルオキシ基が、重合特性等の点から特に一番好ましい。

【0040】次に、本発明における正孔輸送性材料について説明する。

【0041】本発明で「連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物」とは、上記で説明した連鎖重合性官能基が下記で説明する正孔輸送性化合物に官能基として好ましくは2つ以上の化学結合している化合物を示す。この場合、それらの連鎖重合性官能基は、全て同一でも異なったものであってもよい。

【0042】それらの連鎖重合性官能基を2つ以上有する正孔輸送性化合物としては、下記一般式(1)である場合が好ましい。

[0043]

【化12】

$$(P^1)_a - A - \left\{ Z - (P^2)_d \right\}_b \qquad (1)$$

【0044】式中、Aは正孔輸送性基を示す。P'及びP'は連鎖重合性官能基を示す。P'とP'は同一でも異なっても良い。Zは置換基を有しても良い有機基を示す。a、b及びdは0以上の整数を示し、a+b×dは2以上の整数を示す。また、aが2以上の場合P'は同一でも異なってもよく、dが2以上の場合、Z及びP'は同一でも異なってもよい。


【0045】なおことで、「aが2以上の場合P'は同一でも異なっても良く」とは、それぞれ異なるn種類の連鎖重合性官能基をP''、P''、P''、P''、P''・・・・P'"と示した場合、例えばa=3のとき正孔輸送性 50

*基:又はフェニル基、ナフチル基、アンスリル基及びピレニル基等のアリール基等が挙げられる。

【0037】また、上記一般式(6)、(14)及び(15)の中でも、更に好ましい連鎖重合性官能基としては、下記一般式(7)~一般式(13)で示されるものが挙げられる。

[0038]

【化11】



(CH₂)_n (13) (13) (nは1 か53 の数数)

化合物Aに直接結合する重合性官能基P'は3つとも同じものでも、2つ同じで1つは違うもの(例えば、P''とP''とか)でも、それぞれ3つとも異なるもの(例えば、P''とP''とか)でも良いということを意味するものである(「dが2以上の場合P'は同一でも異なっても良く」というのも、「bが2以上の場合、Z及びP'は同一でも異なっても良い」というのもこれと同様なことを意味するものである)。

【0046】上記一般式(1)のAとP¹やZとの結合 30 部位を水素原子に置き換えた正孔輸送化合物は、例え ば、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イ ミダゾール誘導体、トリフェニルアミン等のトリアリー ルアミン誘導体、9-(p-ジエチルアミノスチリル) アントラセン、1,1-ビス-(4-ジベンジルアミノ フェニル)プロバン、スチリルアントラセン、スチリル ビラゾリン、フェニルヒドラゾン類、チアゾール誘導 体、トリアゾール誘導体、フェナジン誘導体、アクリジ ン誘導体、ベンゾフラン誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、チオフェン誘導体及びN-フェニルカルバゾール 40 誘導体等が挙げられる。

【0047】更に、上記正孔翰送化合物の中でも、下記一般式(4)、(5)、(16)、(17)及び(19)から選ばれる式で示される化合物、あるいは下記一般式(18)で示される基を有する縮合環炭化水素又は下記一般式(18)で示される基を有する縮合複素環であるものが好ましい。更に、その中でも、一般式(4)及び(5)で示される化合物である場合が特に好ましい。

[0048]

50 【化13】

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
N \longrightarrow R^{8}
\end{array}$$
(4)

【0049】上記一般式(4)中、R°、R'及びR'は 置換基を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基 及びブチル基等の炭素数10以下のアルキル基、置換基 を有してもよいベンジル基、フェネチル基、ナフチルメ チル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル基 10 R11はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。 又は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基、ア ンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基、チオフェ ニル基、フリル基、ピリジル基、キノリル基、ベンゾキ ノリル基、カルバゾリル基、フェノチアジニル基、ベン ゾフリル基、ベンゾチオフェニル基、ジベンゾフリル基 及びジベンゾチオフェニル基等のアリール基を示す。 【0050】但し、R°、R'及びR"のうち少なくとも 2つはアリール基を示し、R°、R'及びR'はそれぞれ 同一であっても異なっていてもよい。更に、その中でも R⁶、R⁷及びR⁸の全てがアリール基であるものが特に 好ましい。また、上記一般式(4)のR'又はR'又はR "のうち任意の2つはそれぞれ直接もしくは結合基を介 して結合しても良く、その結合基としては、メチレン 基、エチレン基及びプロピレン基等のアルキレン基、酸 素原子及び硫黄原子等のヘテロ原子又はCH=CH基等 が挙げられる。

[0051] 【化14】

$$R^{9}$$
 $N - Ar^{4} - Ar^{5} - N$ R^{11} R^{12} m^{4} (5)

【0052】上記一般式(5)中、m'は0又は1を示 し、m'=1である場合が好ましい。R°~R11は置換基 を有してもよいメチル基、エチル基、プロビル基及びブ* * チル基等の炭素数10以下のアルキル基、置換基を有し てもよいベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル 基、フルフリル基及びチェニル基等のアラルキル基又は 置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基、アンス リル基、フェナンスリル基、ピレニル基、チオフェニル 基、フリル基、ピリジル基、キノリル基、ベンゾキノリ ル基、カルバゾリル基、フェノチアジニル基、ベンゾフ リル基、ベンゾチオフェニル基、ジベンゾフリル基及び ジベンゾチオフェニル基等のアリール基を示し、R°~

【0053】Ar'は置換基を有しても良いアリーレン 基(ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナンス レン、ピレン、チオフェン、フラン、ピリジン、キノリ ン、ベンゾキノリン、カルバゾール、フェノチアジン、 ベンゾフラン、ベンゾチオフェン、ジベンゾフラン、ジ ベンゾチオフェン等より2個の水素原子を取り除いた 基) を示し、Ar'はm'=0の場合、フェニル基、ナフ チル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル 基、チオフェニル基、フリル基、ピリジル基、キノリル 基、ベンゾキノリル基、カルバゾリル基、フェノチアジ ニル基、ベンゾフリル基、ベンゾチオフェニル基、ジベ ンゾフリル基及びジベンゾチオフェニル基等のアリール 基を示し、m'=1の場合は上記Ar'と同様なアリーレ ン基を示す。なお、m'=1の場合は、Ar'とAr'は 同一であっても異なっても良い。

【0054】更にその中でも、上記一般式(5)中のR "~R"が4つとも全てアリール基である場合が特に好 ましい。また、上記一般式(5)のR'とR'®又はR'1 とR''又はAr'とAr'は、それぞれ直接もしくは結合 30 基を介して結合しても良く、その結合基としては、メチ レン基、エチレン基及びプロピレン基等のアルキレン 基、カルボニル基、酸素原子及び硫黄原子等のヘテロ原 子又はCH=CH基等が挙げられるが、これらの中では アルキレン基が好ましい。

[0055] 【化15】

$$R^{21}$$
 $N - R^{25} - Q - R^{26} - N$ R^{23} (16)

【0056】上記一般式(16)中、R*1、R*1、R*1、 及びR¹¹は置換基を有してもよいメチル基、エチル基、 プロピル基及びブチル基等の炭素数10以下のアルキル 基、置換基を有してもよいベンジル基、フェネチル基、 ナフチルメチル基、フルフリル基及びチエニル基等のア ラルキル基又は置換基を有してもよいフェニル基、ナフ チル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル 基、チオフェニル基、フリル基、ビリジル基、キノリル 50 いアリーレン基 (ベンゼン、ナフタレン、アントラセ

基、ベンゾキノリル基、カルバゾリル基、フェノチアジ ニル基、ベンゾフリル基、ベンゾチオフェニル基、ジベ ンゾフリル基及びジベンゾチオフェニル基等のアリール 基を示し、R¹¹、R¹¹、R¹¹及びR¹¹はそれぞれ同一で も異なっていてもよい。R''及びR''は置換基を有して も良いメチレン基、エチレン基及びプロピレン基等の炭 素数10以下のアルキレン基、又は置換基を有しても良 ン、フェナンスレン、ピレン、チオフェン、フラン、ピ リジン、キノリン、ベンゾキノリン、カルパゾール、フ ェノチアジン、ベンゾフラン、ベンゾチオフェン、ジベ ンゾフラン、ジベンゾチオフェン等より2個の水素原子 を取り除いた基)を示し、R''及びR''は同一であって も異なっていても良い。Qは置換基を有しても良い有機 基を示す。

15

【0057】更にその中でも、上記一般式(16)中の R¹¹、R¹¹、R¹¹及びR¹¹のうち少なくとも2つが置換 基を有しても良いアリール基であり、かつR''及びR' が置換基を有しても良いアリーレン基である場合が好ま しく、更にR'1、R'1、R'13及びR'1が4つとも全て置 換基を有しても良いアリール基である場合が特に好まし い。また、上記一般式(16)のR'1、R''及びR''の うち任意の2つあるいはR''、R''及びR''のうち任意 の2つはそれぞれ直接もしくは結合基を介して結合して も良く、その結合基としては、メチレン基、エチレン基 及びプロピレン基等のアルキレン基、酸素原子及び硫黄 原子等のヘテロ原子又はCH=CH基等が挙げられる。

[0058]

【化16】

$$R^{27} - N$$

$$R^{28}$$

$$(17)$$

【0059】但し上記一般式(17)中、R¹¹、R¹⁸及 びAr*のうち少なくとも一つは、下記一般式(18) で示される基を少なくとも一つ有する。

[0060]

$$-\left\{ \text{CH} = \text{CR}^{29} \right\}_{\mathbf{n}^{1}} \text{CH} = N - N$$

$$\text{R}^{30}$$
(18)

【0061】上記一般式(17)及び(18)中、Ar *及びAr'は置換基を有してもよいフェニル基、ナフチ ル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基、 チオフェニル基、フリル基、ピリジル基、キノリル基、 ベンゾキノリル基、カルパゾリル基、フェノチアジニル 基、ベンゾフリル基、ベンゾチオフェニル基、ジベンゾ フリル基及びジベンゾチオフェニル基等のアリール基を 示し、R''、R''、R'''及びR'''は置換基を有してもよ いメチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等の炭 素数10以下のアルキル基、置換基を有してもよいベン ジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フルフリル 基及びチェニル基等のアラルキル基、置換基を有しても よいフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、フェナン

リジル基、キノリル基、ベンゾキノリル基、カルバゾリ ル基、フェノチアジニル基、ベンゾフリル基、ベンゾチ オフェニル基、ジベンゾフリル基及びジベンゾチオフェ ニル基等のアリール基を示し、R²³及びR³⁰はこれらの アルキル基、アラルキル基及びアリール基に加え水素原 子を示す。更に、R''とR''及びR''とR''はそれぞれ 同一であっても異なっていてもよい。

【0062】また、R''又はR''又はAr'のうち任意 の2つ、又はAr'及びR'"はそれぞれ直接もしくは結 合基を介して結合しても良く、その結合基としては、メ チレン基、エチレン基及びプロピレン基等のアルキレン 基、酸素原子及び硫黄原子等のヘテロ原子又はCH=C H基等が挙げられる。n¹は0~2の整数を示す。な お、その中でもR3°がアリール基である場合が好まし く、更にR**とR**がアリール基である場合が特に好ま

【0063】更に、上記一般式(18)で示される基を 有する化合物としては、置換基を有してもよい、ナフタ レン基、アントラセン基、フェナンスレン基、ペレン 20 基、フルオレン基、フルオランセン基、アズレン基、イ ンデン基、ペリレン基、クリセン基及びコロネン基等の 縮合環炭化水素又は置換基を有しても良いベンゾフラン 基、インドール基、カルバゾール基、ベンズカルバゾー ル基、アクリジン基、フェノチアジン基及びキノリン基 等の縮合複素環が挙げられる。

[0064]

【化18】

30

【0065】但し、上記一般式(19)は、下記一般式 (20)で示される基を少なくとも一つ有する。

[0066]

【化19】

$$-\left\{CH = CR^{32}\right\}_{D^{2}} CH = C \begin{pmatrix} Ar^{10} \\ \\ R^{33} \end{pmatrix} (20)$$

【0067】上記一般式(19)及び(20)中、Ar [®]、Ar[®]及びAr¹⁰は置換基を有してもよいフェニル 基、ナフチル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピ レニル基、チオフェニル基、フリル基、ピリジル基、キ ノリル基、ベンゾキノリル基、カルバゾリル基、フェノ チアジニル基、ベンゾフリル基、ベンゾチオフェニル 基、ジベンゾフリル基及びジベンゾチオフェニル基等の アリール基を示し、R31、R31及びR31は置換基を有し スリル基、ピレニル基、チオフェニル基、フリル基、ピ 50 てもよいメチル基、エチル基、プロピル基及びブチル基 等の炭素数10以下のアルキル基、置換基を有してもよ いベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、フル フリル基及びチエニル基等のアラルキル基、置換基を有 してもよいフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、フ ェナンスリル基、ピレニル基、チオフェニル基、フリル 基、ピリジル基、キノリル基、ベンゾキノリル基、カル バゾリル基、フェノチアジニル基、ベンゾフリル基、ベ ンゾチオフェニル基、ジベンゾフリル基及びジベンゾチ オフェニル基等のアリール基を示し、R32及びR33はと 水素原子を示す。なお、Ar*及びAr*とR''とR''は それぞれ同一であっても異なっていてもよい。

17

【0068】その中でも、R*1及びR*1がアリール基で ある場合が好ましい。また、R³¹、Ar[®]又はAr[®]のう ち任意の2つ、又はA r '*及びR''はそれぞれ直接もし くは結合基を介して結合しても良く、その結合基として は、メチレン基、エチレン基及びプロピレン基等のアル キレン基、酸素原子及び硫黄原子等のヘテロ原子又はC H=CH基等が挙げられる。n'は0~2の整数を示 す。

【0069】また、上記一般式(1)中の乙及び上記一 般式(16)中のQは置換基を有してもよいアルキレン 基、置換基を有してもよいアリーレン基、CR1=CR2 (R¹及びR¹はアルキル基、アリール基又は水素原子を 示し、R1及びR1は同一でも異なっても良い)、C= 〇、S=〇、S〇、、酸素原子又は硫黄原子より一つあ るいは任意に組み合わされた有機基を示す。その中でも 下記一般式(2)で示されるものが好ましく、下記一般 式(3)で示されるものが特に好ましい。

[0070]

【化20】

$$\frac{1}{2}\left(x^{1}\right)_{p}\left(Ar^{1}\right)_{q}\left(x^{2}\right)_{r}\left(Ar^{2}\right)_{s}\left(x^{3}\right)_{l}$$

[0071] 【化21】

$$-\left(X^{4}\right)_{\mathbf{q}}\left(Ar^{3}\right)_{\mathbf{v}}\left(X^{5}\right)_{\mathbf{v}}$$
(3)

【0072】上記一般式(2)中、X1~X3は置換基を 40 有してもよいメチレン基、エチレン基及びプロピレン基 等の炭素数20以下のアルキレン基、(CR'=CR') ■1、C=O、S=O、SO、、酸素原子又は硫黄原子を 示し、Ar1及びAr1は置換基を有してもよいアリーレ ン基(ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナン スレン、ピレン、チオフェン、フラン、ピリジン、キノ リン、ベンゾキノリン、カルパゾール、フェノチアジ ン、ベンゾフラン、ベンゾチオフェン、ジベンゾフラ ン、ジベンゾチオフェン等より2個の水素原子を取り除

チル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等のアルキ ル基、置換基を有してもよいフェニル基、ナフチル基及 びチオフェニル基等のアリール基又は水素原子を示し、 R'及びR'は同一でも異なっても良い。m'は1~5の 整数、p~tは0~10の整数を示す(但し、p~tは 同時に0であることはない)。

【0073】上記一般式(3)中、X'及びX'は(CH 、(CH=CR')。、C=O、又は酸素原子を示 し、Ar'は置換基を有してもよいアリーレン基(ベン れらのアルキル基、アラルキル基及びアリール基に加え 10 ゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピ レン、チオフェン、フラン、ピリジン、キノリン、ベン ゾキノリン、カルバゾール、フェノチアジン、ベンゾフ ラン、ベンゾチオフェン、ジベンゾフラン、ジベンゾチ オフェン等より2個の水素原子を取り除いた基)を示 す。R'は置換基を有してもよいメチル基、エチル基、 プロピル基及びブチル基等のアルキル基、置換基を有し ても良いフェニル基、ナフチル基及びチオフェニル基等 のアリール基又は水素原子を示す。m'は1~10の整 数、m³は1~5の整数、u~wは0~10の整数を示 20 す(特に、0~5の整数の時が特に好ましい。但し、u ~wは同時に0であることはない)。

> 【0074】なお、上述の一般式(1)~(3)、 (5)、(6)及び(14)~(20)のR¹~R¹、R **゚**~R ゚゚、A r ゚~A r ゚゚、X ゚~X ゚、 Z 及びQがそれぞ れ有してもよい置換基としてはフッ素、塩素、臭素及び ヨウ素等のハロゲン原子;ニトロ基、シアノ基、水酸 基:メチル基、エチル基、プロビル基及びブチル基等の アルキル基;メトキシ基、エトキシ基及びプロポキシ基 等のアルコキシ基:フェノキシ基、ナフトキシ基等のア 30 リールオキシ基;ベンジル基、フェネチル基、ナフチル メチル基、フルフリル基及びチエニル基等のアラルキル 基;フェニル基、ナフチル基、アンスリル基及びピレニ ル基等のアリール基が挙げられる。また、一般式(4) のR°~R°が有しても良い置換基としてはアリール基を 除いた上記置換基及びジフェニルアミノ基及びジ(p-トリル) アミノ基等のジアリールアミノ基が挙げられ る。

【0075】また、本発明における同一分子内に1つ以 上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物は、酸 化電位が1.2(V)以下であることが好ましく、特に は0.4~1.2(V)であることが好ましい。それ は、酸化電位が1.2(V)超えると電荷発生材料から の電荷(正孔)の注入が起こり難く残留電位の上昇、感 度悪化及び繰り返し使用時の電位変動が大きくなる等の 問題が生じ易く、また O. 4 (V)未満では帯電能の低 下等の問題の他に、化合物自体が容易に酸化されるため に劣化し易く、それに起因した感度悪化、画像ボケ及び 繰り返し使用時の電位変動が大きくなる等の問題が生じ 易くなるためである。

いた基)を示す。R'及びR'は置換基を有してもよいメ 50 【0076】なお、ここで述べている酸化電位は、以下

の方法によって測定される。

【0077】(酸化電位の測定法)飽和カロメル電極を 参照電極とし、電解液にO. 1N(n-Bu),N*C1O √アセトニトリル溶液を用い、ポテンシャルスイーパに よって作用電極(白金)に印加する電位をスイープし、 得られた電流ー電位曲線がピークを示したときの電位を 酸化電位とした。詳しくは、サンプルを0.1N(n-Bu),N'C10,"アセトニトリル溶液に5~10mm o 1%程度の濃度になるように溶解する。そしてこのサ ンブル溶液に作用電極によって電圧を加え、電圧を低電 10 【0079】以下に本発明に係わる、連鎖重合性官能基 位(0V)から高電位(+1.5V)に直線的に変化さ せた時の電流変化を測定し、電流-電位曲線を得る。と の電流-電位曲線において、電流値がピーク (ピークが 複数ある場合には最初のピーク)を示したときのピーク*

19

*トップの位置の電位を酸化電位とした。

【0078】また更に、上記連鎖重合性官能基を有する 正孔輸送性化合物は、正孔輸送能として1×10-1(c) m¹/V. sec)以上のドリフト移動度を有しているも のが好ましい(但し、印加電界:5×10'V/c m)。 l×10-'(cm'/V. sec)未満では電子写 真感光体として露光後現像までに正孔が十分に移動でき ないため見かけ上感度が低減し、残留電位も高くなって しまう問題が発生する場合がある。

を有する正孔輸送性化合物の代表例を挙げるがこれらに 限定されるものではない。

[0080] 【化22】

	-7) & NORCE OF -74 (1622)
No.	化合物例
1	N-N O-C-CH=CH ₂ O-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
2	H ₂ C=CH-CO-CH=CH ₂ O-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
3	O
4	CH ₃ Q CH ₂ CH ₃ O CH ₃ I I I I I I I I I
5	CH ₂ CH ₂ CH ₂ (CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂

21

No.	化合物例
6	H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₂ N-(CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂
7	CH ₃ O CH ₃ H ₂ C=C—C-O(CH ₂) ₂ N-(CH ₂) ₂ O-C-C=CH ₂
8	CH ₃ 0 H ₂ C=C — CO — O CH ₃ O CH ₃ O CH ₂ CH=CH-CH ₂ O CC=CH ₂
9	H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₂ O————————————————————————————————————
10	CH ₃ O CH ₃ H ₂ C=C-C-O(CH ₂) ₁₂ -C-C-C-CH ₂

[0082]

2	23
No.	化 合 物 例
11	(CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂ O H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₂ N-(CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂
12	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ ————————————————————————————————————
13	(CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂ H ₂ C=CH-C-O
14	S-CN O O H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂
15	CH ₃ CH ₃ CH ₂ O CH ₂ O CH=CH-CO-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂

[0083]

【化25】

26

No.	化 合 物 例
16	CH ₂ -O-Ch ₂ -CH ₂ O-C-CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ O-C-C-CH ₂ -CH ₂ -C-C-C-CH ₂ -CH ₂ -C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C
17	H ₂ C=CH-C-O-C-CH ₂ -O-C-CH=CH ₂
18	н,с=ансоан;—{{\rightarrow} = N -{\rightarrow} = CH;-{\rightarrow}
19	CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₃ -O-(CH ₂) ₅ -\bigcip_N-\bigcip_CH ₂ O-C-CH=CH ₂
20	H ₂ C=HOC-COCH ₂ -CH ₂ CH ₂

[0084]

【化26】

	27 2.
No.	化合物例
21	CH ₃ CH ₃ O H ₂ C=CH-C-OCH ₂ O N CH ₂ O-C-CH=CH ₂
22	O CH ₃ 0
23	CH ₂ CH ₂ CH ₂ O CH ₂ O CH ₂ O O C-C-CH=CH ₂
24	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ -√
25	O C ₂ H ₅ O II I

[0085]

【化27】

:	29	30
No.	化合物例	
26	0 C-CH=CH2 (CH2)3 0 (CH2)3 0 (CH2)3 (CH2)3 CCH2-CH=CH2	
27	H ₂ C=CH-CO-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
28	н _г с=сн-со ан ₂ -{}-N-{}- ан, о-с-ан=ан,	
29	CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₂	
30	H ₂ C=CH-CO CH ₂ - CH ₂ O-C-CH=CH ₂	

[0086] 【化28】

3:	1
No.	化 合 物 例
31	CH ₃ O H ₂ C=CH-C-OCH ₂ N CH ₂ O-C-CH=CH ₂
32	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ -\rightarrow-N-\rightarrow-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
33	CH ₃ O CH ₃ O CH ₃ II H ₂ C=C-C-C-C-C-CH ₂
34	CH ₃ O CH ₃ H ₂ C=C - C-O- N- O-C-C=CH ₂
35	CH ₃ O CH ₃

【化29】

[0087]

3	33	34
No.	化 合 物 例	
36	СН ₃ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
37	H ₂ C-CH-COCH ₂ - S-N - CH ₂ O-C-CH=CH ₂	
38	H ₂ C-CH-COCH ₂ -(-)-N-(-)-CH ₂ C-CH-CH-CH-C	Н2
39	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ -\rightarrow-N-\rightarrow-CH ₂ O-C-CH=CH ₂	
40	(CH ₂) ₂ O-C-CH-CH ₂	

【化30】

[0088]

No.	化合物例
41	CH-CH ₂
42	H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₃ -_N-_\(CH ₂) ₃ -O-_\\\CH=CH ₂
43	CH=CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
44	CH=CH ₂ H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₅ -\(\sigma\)-N -\(\sigma\)-(CH ₂) ₅ -O-C-CH=CH ₂
45	H ₂ C-CH-C-OCH ₂ -\rightarrow-N-\rightarrow-CH ₂ O-C-CH-CH ₂

[0089]

【化31】

	(20)	1970 2
	37	38
No.	化 合 物 例	
46	H ₂ C=CH-C-OCH ₂	
47	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ -CH ₂ -	
48	NO ₂ H ₂ C=CCi-C-OCH ₂ -\(\sigma\)-N-\(\sigma\)-CH ₂ O-C-CCi=CH ₂	
49	CH ₃ OCH ₃ OCH ₂ OCH ₃ OCH ₃ OCH ₃	
50	H_2C - C	

[0090]

	39 40
No.	化合物例
51	CH ₂) ₂ O-C=CH-CH ₂
52	CH=CH ₂ CH=CH=CH ₂
53	H ₂ C-CH-COCH ₂
54	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₃ N CH ₃ CH
55	H ₂ C-CH-CH ₂ O(CH ₂) ₂ -\(\)-N -\(\)-(CH ₂) ₂ O-CH ₂ -CH-CH ₂

[0091]

【化33】

4	1 43
No.	化合物例
56	CH ₃ CH ₃ O(CH ₂) ₂ —N—(CH ₂) ₂ O
57	CH ₃ C ₂ H ₅ H ₂ C-CH-CH ₂ O-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
58	CH ₃ CH ₂ C= CH-C-(CH ₂) ₃ -(CH ₂) ₃ -CH-CH ₂
59	(CH ₂) ₇ -CH-CH ₂ (CH ₂) ₇ -CH-CH ₂ (CH ₂) ₇ -CH-CH ₂
60	CH ₃ CH ₂ O-CH

[0092]

43	
No.	化 合 物 例
61	CH_2 - CH_2 - CH_2
62	CH ₃ CH ₂ -CH - CH ₂ CH - CH ₂
63	CH ₂ -CH - CH ₂ CH ₂ -CH - CH ₂ CH ₂ -CH ₂
64	CH ₂ -\(\sigma\)-CH-CH ₂ \(\frac{0}{1}\) \(\text{H}_2C=\text{CH-CH}_2\) \(\text{H}_2C=\text{CH-C-O(CH}_2)_5-\(\text{CH}_2\)\) \(\text{CH}_2\)
65	OH CH ₂ N - CH ₂ O-

[0093]

4	5 4
No.	化合物例
66	O-CH=CH ₂ O-CH=C
67	CH ₃ OCH ₂ N CH ₃
68	0 H ₂ C=CH-C-O-(CH ₂) ₅ -(CH ₂) ₅ -(CH ₂ CH ₂ C-C-CH=CH ₂)
69	CH ₂ -CH CH ₂ -CH O-CH ₂ -CH ₂

[0094]

No.	化 合 物 例
73	CH ₃ CH ₂ C=CH-CH ₂ O(CH ₂) ₂ O-CH ₂ -CH=CH ₂
72	H ₂ C-CH-CH ₂ O-CH ₂ CH-CH ₂
73	$\begin{array}{c} CH_2 \\ CH_2 \\ CH_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 \\ CH_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \\ CH_2 \\ CH_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \\ CH_2 \\ CH_2 \end{array}$
74	$(CH_2) \longrightarrow (CH_2)_3 \longrightarrow $
75	$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} \\ \end{array}$

[0095]

【化37】

4	99	50
No.	化 合 物 例	
76	$\begin{array}{c} CH_2 \\ CH_2 \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_2 \\ CH_2)_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_2 \\ O \end{array}$	
77	O-C-CH=CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₃ O (CH ₂) ₃ CH ₂	
78	O-CH=CH ₂ (CH ₂) ₂ H ₂ C=CH-O-(CH ₂) ₂ -(CH ₂) ₂ -O-CH=CH ₂	
79	O-CH=CH ₂ CH ₂ CH ₂ O-CH=CH ₂	
80	H ₂ C=CH-O-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	

[0096]

		,

51

No.	化合物 例
81	O-CH=CH ₂ O-CH=C
82	0-CH=CH ₂ H ₂ C=CH-\(\bigce \) 0-\(\bigce \) CH=CH ₂
83	H ₂ C=CH-C-O-(CH ₂) ₃ -(CH ₂) ₃ -O-(CH ₂)
84	H ₂ C=CH-O N—CH ₂ CH ₂ -CH=CH ₂
85	H ₂ C=CH-\(\sigma\)-O-\(\sigma\)-O-\(\sigma\)-CH=CH ₂

[0097]

	23	54
No.	化合物例	$\vec{}$
86	CH ₂ O CH ₂ H ₂ C=C-C-O-N-N-CH ₂ CH ₂ O CH ₂	
87	(CH ₂) ₂ O - CH-CH ₂ (CH ₂) ₂ O - CH-CH ₂	
88	O CH ₃ CH ₃ O CH ₃ O CH ₂ C-HC-C-N-N-C-CH-CH ₂	
89	CH=CH ₂	
90	O CH ₃ O CH ₃ O CH ₂ O CH ₃	

[0098]

No.	化 合 物 例
91	CH=CH ₂
92	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ -CH ₂ O-CH=CH ₂
93	CH2O-CH-CH2 CH2O-CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2
94	CH ₂ —CH-O——N——O-CH—CH ₂
95	CH ₂ —CH-O———————————————————————————————————

[0099]

No.	化 合 物 例
96	CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₂
97	S CH2—CH2 H ₂ C=CH-C(CH ₂) ₃ —CH=CH ₂
98	H ₂ C-HCCO N O O H
99	CH ₂ CH ₂ CH ₂ -O(CH ₂) ₅ -N-(CH ₂) ₅ O-(CH ₂)
100	CH ₃ CH ₂) ₅ O-CH ₂) ₅ O-C

【化42】

[0100]

ſ	≺ ।	
•	-	٠,

No.	化 合 物 例
101	HC-CBCO-CH-C-OCC-CH-C-CH-CH-CH,
102	H ₂ C=CH-C-O-_N-_\CH=CH-C-_\O-C-CH=CH ₂
103	H ₂ C-CH-CH ₂ CH ₂
104	H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₃ -\rightarrow N-\rightarrow (CH ₂) ₂ -\rightarrow D
105	CH ₃ (CH ₂) ₂ O-C-CH=CH ₂ H ₂ C=CH-C-O(CH ₂) ₂ -\(\sigma\)-N-\(\sigma\)-N-\(\sigma\)-CH ₃

[0101]

6	51	62
No.	化合物例	
106	CH_2O - C - CH = CH_2 H_2C = CH - C - OCH_2 N C_2H_3	
107	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂	
108	CH ₂ -CH-OCH ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃	
109	H ₂ C=CH-C)-C-CH=CH ₂	
110	CH ₃ CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₃ CH ₂ -CH ₂ O-C-CH=CH ₂	

[(10102]

6	53 64
No.	化合物例
111	CH ₃ CH ₃ H ₂ C=CH-O(CH ₂) ₂ −
112	$H_2C=CH$ O(CH ₂) ₂ O(CH ₂) ₂ CH=CH ₂
113	H ₂ C=CH-COCH ₂ CCH ₂ D ₂ CH
114	H ₂ C=CH-CH-CH ₂ SO ₂
115	H ₂ C=CH-C-O-{\infty}-N-{\infty}-CH=CH-C-{\infty}-O-C-CH=CH ₂

[0103] 【化45】

	(34)	א משער
(55	66
No.	化 合 物 例	
116	CH ₂ =CH-C-O-(CH ₂) ₂ (CH ₂) ₂ O-C-C=CH ₂ CH ₃	
117	CH ₂ =CH-C-O-(CH ₂) ₂ (CH ₂) ₂ O-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	·
118	CH2=CH-C-O-(CH2)7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	H ₂
119	CH ₂ =CH-C-O-(CH ₂) ₂ (CH ₂) ₂ O-CH ₂ -CH=CH ₂	
120	CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3	H ₂

[0104]

【化46】

No.	化 合 物 例
121	О СН ₃ СН ₃ О СН ₂ =CH-C-OCH ₂ N-СП-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
122	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -N-CH ₂ -CH ₂
123	CH ₂ =CH-C-0-CH ₂ -CH ₂
124	CH ₂ =CH-C-O-(-)-N-(-)-CH=CH-(-)-N-(-)-O-C-CH=CH ₂
125	CH ₂ =CH-C-O-(

[0105]

•	3	O	,
١.	•	•	

No.	化合物 例
126	CH ₂ -CH-C-O-\(\)-N-\(\)-C-\(\)-N-\(\)-C-\(\)-N-\(\)-O-C-CH-CH ₂
127	CH2=CH-CO-()-N-()-O-CH2CH2O-()-N-()-O-C-CH-CH2
128	CH3
129	СН ₂ -СН-СО-СО-СО-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-СН-
130	CH, CH, CH, O

[0106]

【化48】

	(37)
,	71 72
No.	化合物例
131	CH ₂ =CH ₂ CH ₂ CH ₃ CH ₂ CH ₃ CH ₂ CH ₃ CH ₂
132	CH ₂ =CH-CO-()-N-()-CH ₂ -O-CH ₂ -()-CH ₂ -CH ₂
133	CH ₂ =CH-CO-_N-_N-_CH ₂ -CH
134	CH ₂ =CH-CO-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-CO-CH=CH ₂ CH ₃
135	

【化49】

[0107]

136 CH₂=CH-CO N O CH₂CH₂CO N O CCH=CH₂

137 CH₂=CH-CO N O CH₂CH₂CO N O CCH=CH₂

138 CH₂=CH-CO N O CH-CH₂CH-CH₂

139 CH₂=CH-CO N O CH-CH₂CH O CH-CH₂

140 CH₂CH-CO O CH-CH₂

140 CH-CO O CH-CO O CH-CO O CH-CH₂

140 CH-CO O CH-CO O

[0108] [化50]

No. 化合物例

CH₂-CH-CO N-()-CH₂-CH-CH₂

NO₂

NO₂

NO₂

[0109]

142

77

No.	化 合 物 例
146	CH ₂ -CH-CO-CH ₂ -O-CH
147	CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-
148	CH3 CH2-CH-CH-CH2 CH2-CH-CH2
149	CH2-CH COCH2 CH3
150	CH ₃ CH ₃ OCH ₃ OCCC-CH ₂

[0110]

【化52】

No.	化合物例
151	CH2-CHCCAPOCCAP-CH2 CH2-CHCCAPOCCAP-CH2 CH2-CHCCAPOCCAP-CH2
152	an-angaro
153	CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂
154	CH2-CH-CH2
155	CH ₂ -CH-CCH ₂ O CH ₃ CH ₂ O CCH-CH ₂ CH ₂ -CH-CO-CH-CH ₂

[0111]

【化53】

1	81 82
No.	化合物例
156	CH ₂ =CH-C-C ₆ H ₁₂ O-C-CH=CH ₂
157	CH ₂ -CH ₂ O-CCH ₂ O-CCH-CH ₂
158	CH2-CH-CO-CD-CH2-OCH2-CH2-CH2
159	CH ₂ -CH-CO-CH ₂ -CH ₂ -
160	CH2-CHCOCH2-(-)-CH2N-(-)-CH-CH(-)-NCH2-(-)-CH2OCCGS-CH2

[0112]

No.	化 合 物 例
161	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂
162	CH ₂ -CH-COCH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
163	CH ₂ =CH-COCH ₂ -CH ₂ -C
164	CH3-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH2
165	

[0113]

٦)

No.	化 合 物 例
166	CH-CHLO OGH ON OGH-CH,
167	CH2-CH-CO-N-N-N-N-N-O-CCH-CH2
168	CH2-CH-CO N- S N- OCCIP-CH2
169	CHI, CHEO CHI,O CH
170	СH ₂ -CH-С-О-С-СH ₂ CH ₂ -CH-С-О-С-СН ₂ CH ₃

[0114]

8	7	8
No.	化合物例	
171	CH ₂ -CH-C-O-C-C-CH ₂ CH ₂ -CH-C-O-C-C-CH ₂ CH ₂ -CH-C-O-C-C-CH ₂ CN	
172	CH ₂ =CH-CO\\\ N\\\ S\\\\ N\\\\	
173	CH2=CH-C-O-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	
174	CH ₂ =CH-C-O-N-N-SO ₂ -N-N-O-C-CH=CH ₂	
175	CH2-CH-CH20 CH20 CH2-CH20 CH2-CH20 CH20 C	=CH ₂

[0115]

No.	化合物例
176	CH ₂ -CH-COCH ₂ CH-COCH ₂
177	CH ₂ -CH-C-OCH ₂ N CH ₂ OC-CH-CH ₂
178	CH2-CH-CO\\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
179	CH3-CH2OONOCH2OCH-CH3
180	CHy-CH-COCHY () CHy WCHy () CHy OC CH-CHy

[0116] [化58]

(4

No.	化合物 例
181	CH ₂ =CH-COCH ₂ N- CH ₂ -O-CH ₂ N- CH ₂ O-CH ₂ -CH ₂
182	
183	CH3 CH2
184	CH ₂ -CH-COCH ₂ CH ₂ -CH-CH-CH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ CH ₂ O-C-CH-CH ₂ CH ₂ O-C-C-CH-CH ₂ CH ₂ O-C-C-C-CH-CH ₂ CH ₂ O-C-C-C-C-CH-CH ₂ CH ₂ O-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C
185	CH ₂ =CH-CO- N- CH=CH- N- N- O-C-CH=CH ₂

[0117]

No.	化 合 物 例
186	CH2=CH-CO-C)-N-C)-CH=CH2
187	CH ₂ =CH-CO-{\rightarrow} N-{\rightarrow} - \rightarrow N-{\rightarrow} - \rightarrow N-{\rightarrow} - \rightarrow CH=CH ₂
188	CH2=CH-C-0-{\infty} N -{\infty} -0-CH2CH2-0-{\infty} N -{\infty} -0-C-CH=CH2
189	CH ₃ CH ₂ O-Ch ₂ O-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ CH ₃ CH ₃
190	OCH ₃ CH ₃ O CH

[0118]

[0119] [化61]

[0120]

9	99 10
No.	化 合 物 例
201	CH ₂
202	CH2=CH-CO- N- N- CH2-CH=CH2
203	HC=CH ₂
204	CCCH=CH ₂ CC-CH=CH ₂ CC-CH=
205	CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ -CH-CH-CH CH ₂ -CH-CH-CH CH ₂ -CH-CH-CH CH ₃ -CH-CH-CH CH ₃ -CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH ₂

[0121]

	101 102		
No.	化合物例		
206	HD-C-CH ₂ CH ₂ O ₃ C-CH ₂ CH ₂ O ₃ C-CH ₂ CH ₂ O-C-CH ₂ CH ₂ O		
207	CI. CI.		
208	H ₂ C=CH-CH ₂ -0-CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂		
209	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₂ -CH-CH-CH ₂ CH ₂ O-C-CH-CH ₂		
210	CH ₃		

[0122]

【化64】

104

No.	化合物例
211	CH ₂ CH ₃ CH ₄ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃
212	CH ₃
213	CB ₂ = CH-CH ₂ -OCB ₂ N- CH ₃
214	
215	City City City City City City City City City City City City City

[0123]

【化65】

7	105
No.	化合物例
216	H ² C=CH-COCH ² N- O-(CH ²) ¹⁰ -O-(CH ²) ¹⁰ -O-CH ² O-C-CH=CH ²
217	н ₂ Сэ-сн-Сосн ₂ Сун ₇
218	CH_CH-OCH_CD_NCH_CD_NCH_CH_2
219	H ₂ C=CH-COCH ₂ CH ₃
220	CH2=CH-CO-()-N-()-CH2CH2()-CH2CH2()-N-()-O-()

[0124] 【化66】

108

No.	化 合 物 例
221	
222	CH2-CH-CO N N OCH-CH2
223	CH-CH, CH-CH, CH-CHCOOOCHOOOHOOOOCCH-CH,
224	CH2-CH-CH-CH CH3-CH-CH-CH CH3 CH3 CH3
225	CH3-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-CH-COCH3 CH3 CH3-CH-CH-CH-CH3 CH3-CH-CH-CH3 CH3-CH-CH-CH3 CH3-CH-CH-CH3 CH3-CH-CH3 CH3-CH-CH3 CH3-CH-CH3 CH3-CH-CH3 CH3-CH3 CH3-CH

【化67】

[0125]

No.	化合物例
226	CH ₂ -CH-COCH ₂ ()-N-()-CH-CH CH ₂ -CH-COCH ₂ ()-N-()-CH ₂ O()-CH
227	CH3 CH3 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4
228	CH-CH-COCHY N-O-O-O-O-O-O-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-
229	
230	H2O-CH-COCH3 N- N- N- CH2O-CH-CH2

[0126]

【化68】

:	111 112
No.	化合物例
231	H ₁ C=CH=COCH ₂ CH=OCH ₂ CH=OCH ₂ CH=OCH ₂ CH ₂ OCH=CH
232	$H_2C=CH$ N $CH_2C=CH$ CH_2C
233	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ NO ₂ NO ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂
234	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ N CH ₂ O-C-CH-CH ₂
235	H ₂ C=CH-C-O-CH ₂ CH ₂ H ₂ C=CH-C-O-CH ₂ CH ₂ H ₂ C=CH-C-O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ H ₂ C=CH-C-O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂

[0127]

1	113
No.	化 合 物 例
236	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $
237	ст. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн. Сн
238	H ₂ C=CHCO C ₂ H ₃ C ₂ H ₃ C ₂ H ₃
239	CH2-CH-COCH2 N- O-(CH2O)4 N- O-CCH-CH2
240	CH ₂ =CH-C-O-\Bigcolombox N-\Bigcolombox O-C-CH=CH ₂

[化70]

[0128]

115

No.	化 合 物 例
241	CH ₂
242	CH ₂ =CH-C-O-_N-_N-_N-_N-_N-_O-C-CH=CH ₂
243	CH ₂ =CH-C-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
244	OC ₃ H ₇ OC ₃ H ₇ OC ₂ CH ₂ =CH-CO-O-O-C-CH=CH ₂
245	CH ₂

[0129]

117

No	化合物例
246	CH ₂ =CH-C-O-O-N-O-C-CH=CH ₂
247	CH2=CH-CO-CH2 CH2-CH2-CH2-CH2
248	CH ₂ =CH-C-CH ₂ O - N - CH ₂ O-C-CH=CH ₂
249	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ - C ₂ H ₅ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ - C ₂ H ₅
250	CH ₂ =CH-CO-CH ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ O

[0130]

1	19	120
No.	化 合 物 例]
251	CH ₂ =CH-C-O-O-N-O-C-CH=CH ₂	
252	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂	
253	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -\(\begin{array}{c}\) CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -\(\begin{array}{c}\) CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -\(\begin{array}{c}\)	
254	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -\rightarrow N-\rightarrow N-\righta	
255	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -\rightarrow N-\rightarrow C ₂ H ₅ CH ₂ =C C-OCH ₂ CH ₂ -\rightarrow N-\rightarrow C ₂ H ₅	

[0131]

No.	化合物例
256	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-C ₂ H ₅ CH ₂ -CH-CH ₂ OCH ₂ CH ₂ CH ₂
257	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ -CCH ₂ -OCH ₂ CH ₂
258	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -N-C-C ₂ H ₅
259	CH ₃
260	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

[0132]

No.	化 合 物 例
261	CH ₂ =CH-C-CH ₂ O-(\) CH ₃ CH ₃ O-(\) CH ₂ =CH-C-CH ₂ O-(\) CH ₃ CH ₃ O-(\)
262	$CH_2 = CH \cdot C \cdot O \longrightarrow N \longrightarrow CH_2 \longrightarrow CH_2$
263	CH ₂ =CH-COCH ₂ N-Ch ₂ O-C-CH-CH ₂
264	CH ₂ =CH-COCH ₂ CH-COCH ₂ CH ₂ =CH-COCH ₂
265	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₃ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂

[0133] [化75]

123

1	25 12
No.	化 合 物 例
266	CH ₂ =CH-COCH ₂ CH ₂ =CH-COCH ₂ CH ₂ =CH-COCH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ -CH-COCH ₂ CH-COCH ₂ CH
267	CH ₂ =C-C-OCH ₂ N-CH ₂ O-C-C=CH ₂
268	CH ₂ CH-CH ₂ -OCH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂
269	CH ₂ -OCH ₂ -OCH ₂ -CH ₂ O-CH ₂ CH ₃
270	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂

[0134] 【化76】

No.	化 合 物 例
271	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ H ₃ C CH ₂ O-C-CH=CH ₂ H ₃ C N
272	CH2=CH-CO-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
273	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N N O-C-CH=CH ₂
274	CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-C-CH ₂ - N-C-C-CH=CH ₂
275	CH ₂ -CH-CO-(CH ₂) ₅ -\rightarrow N-\rightarrow \rightarrow \righ

[0135] [化77]

No.	化合物倒
276	CH ₃ O C ₂ H ₅ CH ₃ O CH ₃ CH ₂ =C-C-C-C-CH ₂
277	CH ₂ =CH-C-CH ₂ O-C-CH=CH ₂
278	OC ₃ H ₇ OC ₄ OC ₅ OC ₅ CH ₂ CH ₂ OC ₅
279	CH ₂ =CH-C-O-N-N-N-O-C-CH=CH ₂
280	CH ₂ =CH-C-O-C-CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-N-N-N-N-N-C-CH=CH ₂

[0136]

131

No.	化 合 物 例
281	CH ₃ CH ₃ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-O CH ₃ CH ₃
282	$C_{2}H_{3}$ $C_{2}H_{3}$ $C_{2}H_{3}$ $C_{2}H_{3}$ $C_{2}H_{3}$ $C_{3}H_{3}$ $C_{4}H_{2}$ $C_{5}H_{5}$ $C_{7}H_{5}$ $C_{8}H_{9}$ $C_{$
283	CH ₃ CH ₃ CH ₂ =CH-C-O \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
284	CH2=CH-COCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2C
285	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -C

[0137]

No.	化 合 物 例
286	CH ₂ -CH OCH ₂ CH ₂ N N C ₄ H ₉ CH ₂ -CH OCH ₂ CH ₂
287	CH ₂ CH ₂ -CH
288	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂
289	CH2-CH_COCH2CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C
290	CH1-CH-COCH,CH1-CH2

[(138]

1	35	136
No.	. 化合物例	
291	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-O - N - O - C-CH=CH ₂	
292	CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂	
293	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\text{CH}_2\text{-}\\ \text{CH}_2\text{-}\\ $	
294	CH ₂ =CH-CH ₂ ·OCH ₂ ·OCH ₂ ·CH ₂ O-CH ₂ ·CH ₂ ·	=CH ₂
295	CH ₂ =CH-OCH ₂ -CH ₂ O-CH=CH	2

[0139]

1	37
No.	化 合 物 例
296	
297	CH ₂ =CH-CO-O-C-CH=CH ₂
298	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ OC-CH=CH ₂
299	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N- O-(CH ₂ CH ₂) ₅ -O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂
300	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N O O O CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N O O O O O O O O O O O O

[0140]

:	139	140
No.	化 合 物 例	
301	CH2=CH-C-OCH2CH2 CH2=CH-C-OCH2CH2 CH2=CH-C-OCH2CH2 N-C-OCH2CH2 N-C	CH ₂
302	CH ₂ =CH-C-O-{\rightarrow}-\rightarrow\-\rig	
303	CH ₂ -CH=CH ₂ CH ₂ -CH=CH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂	
304	CH ₂ =CH-C-O-()-N-()-O-(-CH ₂ -CH ₂	
305	CH ₂ -CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ -CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-C-CH-CH	2

[0141]

【化83】

No.	化 合 物 例
306	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-CH ₃ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
307	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -N-CH ₂ -CH ₂
308	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-C ₄ H ₉ n-C ₄ H ₉ n-C ₄ H ₉ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
309	CH ₂ =CH-C-O-\rightarrow N-\rightarrow -O-C-CH=CH ₂
310	CH ₂ =CH-C-O-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[0142]

No.	化 合 物 例
311	CH ₂ =CH-CO-O-C-CH=CH ₂
312	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -C
313	CH ₂ =CH-C-O CH ₃ CH ₂ O-C-CH=CH ₂
314	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-N-N-N-N-O-C-CH=CH ₂
315	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₃ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂

[0143]

146

No.	化 合 物 例
316	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O H ₃ C CH ₃ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O N
317	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-CH ₃ CH ₃ C
318	CH ₂ =CH-C-O, CH ₃ CH ₃ O-C-CH=CH ₂
319	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N O CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O CH ₂ -CH-C-OCH ₂ CH ₂ O CH-C-C-CH-C-OCH ₂ CH ₂ O CH-C-C-CH-C-C-OCH ₂ CH ₂ O CH-C-C-CH-C-C-OCH ₂ CH ₂ O CH-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C
320	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂

[0144]

【化86】

1	47	1
No.	化合物例	
321	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂	
322	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ -CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ -CH ₂ CH ₂ -CH-C-OCH ₂ -CH ₂ -CH ₂ CH ₂ -CH-C-OCH ₂ -CH	
323	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -	
324	CH ₃ -CH ₂ -	
325	CH ₂ CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=C CH ₃ -O-C-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=C	

[0145] 【化87】

149 1				
No.	化 合 物 例			
326	CH ₃ CH ₂ CH ₃ CH ₂ CH ₃ CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
327	CH ₃ -CH=CH ₂ -O-CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ -CH=CH ₂ O-CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ O O-CH ₂ -O-C-CH=CH ₂			
328	CH ₃ -CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ -CH ₂ -CH			
329	CH ₃ CH ₃ CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ O-C-CH=CH ₂ O	٠.		
330	O 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

[0146]

[化88]

1	51 1
No.	化合物例
331	CH ₂ CH ₂ CO-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH ₂ CO-C-CH=CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ CO-C-CH=CH ₂
332	CH ₃ O O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ O O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ O O-CH ₂ CH ₂ -O-C-C-CH=CH ₂ O
333	CH ₃ -CH ₂ -
334	CH ₃ CH ₃ CH ₃ O CH=CH ₂ CH ₃ O -C-CH=CH ₂ O -C-CH=CH ₂
335	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -C-C-CH ₂ -CH

[0147]

【化89】

1	.53
No.	化 台 物 例
336	CH ₃ CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂
337	CH ₃ O CH ₂ =C-C-OCH ₂ CH ₂ O CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH=C
338	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -CH=C CH ₂ -CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH=C
339	CH ₂ =CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -CH=C
340	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH CH ₂ -CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ N CH=C

[0148]

No.	化合物例
341	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-OCH ₂ CH ₂
342	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH
343	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
344	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
345	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH=C

[0149]

No.	化合物例
346	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH-C-OCH ₂
347	CH2-CH-COCH2CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C
348	CH2-CH-COCH2CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C
349	NO ₂ CI CH=CH-CH=C O O CH=CH ₂ O O CCH=CH ₂
350	CH ₃ CH ₃ CH ₂

[0150]

【化92】

1	59 10
No.	化合物例
351	CH ₃ -CH ₂ -O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH ₂ CH ₂ CH ₃ -CH ₂
352	O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂
353	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₃ -CH ₃ -CH ₂ -CH ₃ -C
354	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -N-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -N-C-CH=CH ₂
355	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH=CH ₂

[0151] 【化93】

٦/		

No.	化 台 物 例
356	CH ₂ =CH-CO-CD-C-CH=CH ₂ C=CH-CN-CH=CH ₂
357	CH ₂ =CH-C-O - CH=CH ₂ CH=CH ₂
358	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CO-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-CO C=CH CH=CH ₂
359	CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-CO-CH=CH ₂ CH ₂ CH-CO-CH=CH ₂ CH ₂ CH-CO-CH=CH ₂
360	CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂

(82)

[0152]

【化94】

No.	化合物例
361	CH ₂ -CH-CO-CH-CH ₂
362	CH ₃ CH=CH ₂ CH=CH ₂ CH=CH ₂
363	CH ₂ =CH-CO CH=CH ₂
364	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCH ₂ CH ₂ -CH-OCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCCH ₂ CH ₂ -CD-CH-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
365	CH ₂ =C—COCH ₂ CH ₂ —CH=CH=CH ₂ CH ₂ CH ₃ OCC-CH ₂

[0153]

【化95】

	165
No.	化合物例
366	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH
367	CH ₂ -CH-CH ₂ OCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH ₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-C
368	CH ₂ OCH ₂ CH ₂
369	CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₃ -CH-CH ₂ CH ₃ -CH-CH ₂
370	CH ₂ =CH-OCH ₂ CH ₂ ————————————————————————————————————

[0154] 【化96】

No.	化合物例
371	H ₂ C=CH-CO-CO-CH ₂ -CO-CCH-CH ₂
372	H ₂ C=CH-C-O-\SO ₂ -\CH ₂ -\N-\CH ₂ -\N-\CH ₂ -\N-\CH ₂ -CH ₂ -CH ₂
373	CH-C CH-CH ₂ C-CH ₂ C-C-CH ₂ CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-CH ₂ CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-CH ₂ C-C-C-C-CH ₂ C-C-C-C-CH ₂ C-C-C-C-CH ₂ C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-
374	CH ₂ -OCH ₂ CH ₂
375	CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-O-C-CH=CH ₂

[0155]

1	69 17
No.	化合物例
376	CH ₂ =CH-CO-CH=CH ₂ (CH ₂ 0) ₅ -C-CH=CH ₂ (CH ₂ 0) ₅ -C-CH=CH ₂ (CH ₂ =CH-CO-C-CH=CH ₂ (CH ₂ 0) ₅ -C-CH=CH ₂ (CH ₂ 0) ₅ -C-CH=CH ₂ (CH ₂ 0) ₅ -C-CH=CH ₂
377	CH ₂ =CH-C-O-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ =CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH=CH ₂ CH ₂ CH-C-CH ₂ CH ₂ CH-
378	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ O CH=C
379	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH
380	CH ₂ =CH-OCH ₂ CH ₂ -CH=CH-CH-CH ₂ -CH ₂ -CH=CH-CH-CH ₂ -CH ₂ -CH=CH-CH-CH-CH ₂ -CH

[0156]

【化98】

172

No.	化合物的例
381	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O
382	CH ₂ =CH-COCH ₂ CH ₂ -CN-CH=CH-CD-OC ₂ H ₃
383	CH ₂ -CH-COCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH-CCH-CH ₂ CH-CCH-CH ₂ CH-CCH ₂ CH ₂ CH-CCH-CCH ₂ CH ₂ CH-CCH-CCH ₂ CH ₂ CH-CCH-CCH ₂ CH ₂ CH-CCH-CCH ₂ CH-CCH-CCH-CCH ₂ CH-CCH-CCH-CCH ₂ CH-CCH-CCH-CCH ₂ CH-CCH-CCH-CCH-CCH-CCH-CCH-CCH-CCH-CCH-
384	CH ₂ CH-OCH ₂ CH ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂
385	CH ₂ =CH-C-O

[0157]

【化99】

1	7	3

No.	化 合 物 例
386	CH ₂ =CH-CO CH ₂ =CH-CO CH=CH ₂
387	CH ₂ =CH-CH ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃
388	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N-C-OCH ₂ CH
389	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH=CH ₂ O-C-CH=CH ₂
390	CH ₂ =C—C-OCH ₂ CH ₂ — CH ₂ =C—C-OCH ₂ CH ₂ — CH ₂ =C—C-OCH ₂ CH ₂ — CN

[0158]

【化100】

No.	化 合 物 例
391	CH ₂ -C-COCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃
392	CH ₂
393	CH ₂ -CH ₂ -
394	CH ₃ S-CH=CH ₂ O-CCH ₂ CH ₂ O-CCH=CH ₂
395	CH ₂ -CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ -CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₃

[0159]

【化101】

No.	化 合 物 例
396	CH ₃ -CH ₂ CH ₂ O-(CH ₂) ₇ -O-C-CH=CH ₂ CH ₃ -CH ₂ O-CH ₂ CH ₂ -O-C-CH=CH ₂ 0
397	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
398	C ₂ H ₅ N - CH=N-N CH ₂ O-C-CH=CH ₂
399	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ H ₂ C=CH-C-OCH ₂ H ₂ C=CH-C-OCH ₂
400	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ O H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH=N-N

[0160]

【化102】

(91)

1	QΛ	

No.	化 合 物 例
40 1	H ₂ C=CH-C-(CH ₂) ₃ -\bigcip N-\bigcip S-CH=N-N
402	CH ₃ OOC O H ₂ C=C -C-OCH ₂ CH ₃ O H ₂ C=C -C-OCH ₂ CH=N-N CH ₃ OOC
403	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ O H ₂ C=CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH=N-N
404	O CH ₃ O CC-CH ₃ O CH ₃ O C
405	CH ₃ O CH ₂ O-C-CH=CH ₂ CH=N-N

[0161]

【化103】

181

No.	化合物例
406	CH=N-N CH ₂ O-C-CH=CH ₂
407	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
408	CH ₃ O H ₂ C=C-C-C-C-CH-CH=N-N
409	CH ₂ -CH- CH ₂ - CH ₂ - CH ₂ - CH ₂ - CH- CH ₂ - CH- CH ₂ - CH- CH- CH- CH- CH- CH- CH- CH- CH
410	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂

[0162]

【化104】

1	ΩI	

No.	化介物例
411	CH ₂ =CH-C ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -CH=N-N CH ₂ =C - C ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH=N-N
412	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O CH ₂ -CH-CH ₂ OCH ₂ CH ₂ O CH ₂ -CH-CH ₂ OCH ₂ CH ₂
413	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -CH=N-N
414	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -CH=N-N
415	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ -CH=N-N CH ₂ =CH-OCH ₂ CH ₂ -CH=N-N

[0163]

No.	化合物例
416	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂
417	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₃ CH ₃
418	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ O CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₃
419	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂ N CH ₂ =CH-C-OCH ₂ CH ₂
420	CH ₂ O-C-CH=CH ₂

[0164]

【化106】

18	7	188
No.	化 合 物 例	
421	$CH_2=CH-C-OCH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$	
422	$CH_{2}=CH-C-OCH_{2}-CH_{2}$ $CH_{2}=CH-C-OCH_{2}-CH_{2}$ $CH_{2}=CH-C-OCH_{2}-CH_{2}$ $CH_{2}=CH-C-OCH_{2}-CH_{2}$	
423	$\begin{array}{c} O \\ \square \\ CH_2=CH\text{-}C\text{-}OCH_2 \\ O \\ CH_2=CH\text{-}C\text{-}OCH_2 \\ \end{array} \begin{array}{c} CI \\ N \\ CH=N\text{-}N \\ CH_2 \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 \\ \end{array}$	
424	CH ₂ =CH-C-OCH ₂ -CH ₃ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ -CH ₃ CH ₂ =CH-C-OCH ₂ -CH ₃ CH ₂ -CH ₃ -	
425	H ₃ C CH ₃ O CH ₂ O-C-CH=CH ₂ O CH ₂ O-C-CH=CH ₂	

[0165]

【化107】

190

No.	化 合 物 例
426	CH=N-N (CH ₂ O) ₃ -C-CH=CH ₂ O) ₃ -C-CH=CH ₂ O
427	CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH ₂ -
428	CH ₂ =CH-C-O- N- CH=N-N 0 0 C-CH=CH ₂ CH ₂ -CH-C-O- O-C-CH=CH ₂
429	CH ₂ -CH-CH ₂ -CH-CH ₂ CH ₃ -CH-N-N H ₃ C
430	CH ₂ =CH-C-O-CH ₂ -O-CH ₂ -O-CH ₂ -O-CH ₂ -CH-CH ₃ CH ₂ =CH-C-O-CH ₂ -O-CH ₂

[0166]

【化108】

191

No.	化 合 物 例
431	CH ₃ O CH ₂ =C - C-OCH ₂ - CI CH ₃ O CH ₂ =C - C-OCH ₂ - N- CH=N-N
432	CH ₂ -CH-CH ₂ -OCH ₂ -CH-N-N CH ₂ -CH-CH ₂ -OCH ₂ -CH-N-N
433	CH ₂ -OCH ₂ -CH ₃ CH ₂ -OCH ₂ -CH ₃ CH ₂ -OCH ₃
434	CH ₂ =CH - CH ₂ -OCH ₂ - CH ₃ - CH-N-N - CH ₃ - CH ₂ -CH ₂ -OCH ₂ - CH ₃
435	CH ₂ =CH - CH ₂ - CH ₃ CH ₂ =CH - CH ₂ - CH ₃

[0167] [化109]

	193
No.	化 合 物 例
436	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CI CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH-N-N
437	CH ₂ =CH-CH ₂ OCH ₂ CH ₂
438	CH ₂ -CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH-CH ₂ N CH=N-N
439	CH ₂ =CH-CH ₂ -OCH ₂ CH ₂ -CH=CH ₂ CH=N-N CH=N-N
440	H ₂ C=CH-C-O() CH ₂ () +00C() N() + C00-() + CH ₂ () +0-C-CH=CH ₂

[0168]

【化110】

No.	化合物例
441	H ₂ C=CH-CO\sqrt2\sqrt2\chi2\sqrt2\s
442	H ₂ C=CH-C-OCH ₂ (CII ₂) ₂ (CII ₂) ₂ N(CH ₂) ₂ (CH ₂) ₂ C-CH=CH ₂

【0169】本発明においては、前記同一分子内に二つ 以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重 合することで、保護層中において、正孔輸送能を有する 化合物は二つ以上の架橋点をもって3次元架橋構造を形 成する。前記正孔輸送性化合物はそれのみを重合させ る、あるいは他の連鎖重合性官能基を有する化合物と混 合させることのいずれもが可能であり、その種類/比率 は全て任意である。ととでいう他の連鎖重合性官能基を 有する化合物とは、連鎖重合性官能基を有する単量体あ 40 るいはオリゴマー/ポリマーのいずれもが含まれる。

【0170】正孔輸送性化合物の官能基とその他の連鎖 重合性化合物の官能基が同一の基あるいは互いに重合可 能な基である場合には、両者は共有結合を介した共重合 3次元架橋構造をとることが可能である。両者の官能基 が互いに重合しない官能基である場合には、保護層は二 つ以上の3次元硬化物の混合物あるいは主成分の3次元 硬化物中に他の連鎖重合性化合物単量体あるいはその硬 化物を含んだものとして構成されるが、その配合比率/ 製膜方法をうまくコントロールすることで、IPN(I 50 好ましい。放射線による重合の最大の利点は、重合開始

nter Penetrating Network) すなわち相互進入網目構造を形成することも可能であ

【0171】また、前記正孔輸送性化合物と連鎖重合性 官能基以外の重合性基を有する単量体あるいはオリゴマ ー/ポリマー等から保護層を形成してもよい。また、そ の他の各種添加剤、フッ素原子含有樹脂微粒子等の潤剤 その他を含有してもよい。

【0172】本発明において、連鎖重合性官能基を有す る正孔輸送性化合物は熱、可視光や紫外線等の光、更に 放射線により重合することができる。従って、本発明に おける保護層の形成は、保護層用の塗工液に前記連鎖重 合性官能基を有する正孔輸送性化合物と必要によっては 重合開始剤を含有させ、該塗工液を用いて形成した塗工 膜に光又は放射線を照射することによって該連鎖重合性 官能基を有する正孔輸送性化合物を重合させる。なお、 本発明においては、その中でも放射線によって該連鎖重 合性官能基を有する正孔輸送性化合物を重合することが

剤を必要としない点であり、これにより非常に高純度な 3次元保護層の作製が可能となり、良好な耐久性が確保 される点である。また、短時間でかつ効率的な重合反応 であるがゆえに生産性も高く、更には放射線の透過性の 良さから、厚膜時や添加剤等の遮蔽物質が膜中に存在する際の硬化阻害の影響が非常に小さいこと等が挙げられ る。但し、連鎖重合性官能基の種類や中心骨格の種類に よっては重合反応が進行しにくい場合があり、その際に は影響のない範囲内での重合開始剤の添加は可能であ る。この際、使用する放射線とは電子線及びヶ線である 10 が、特には電子線が好ましい。

197

【0173】電子線照射をする場合、加速器としてはスキャニング型、エレクトロカーテン型、ブロードビーム型、バルス型及びラミナー型等いずれの形式も使用するととができる。電子線を照射する場合に、本発明の電子写真感光体においては電気特性を発現させる上で照射条件が非常に重要である。本発明において、加速電圧は250KV以下である。また、線量は好ましくは1Mrad~100Mradの範囲、より好ましくは3Mrad~50Mradの20範囲である。加速電圧が250KVを超えると感光体特性に対する電子線照射のダメージが増加する傾向にある。また、照射線量が1Mradよりも少ない場合には硬化が不十分となり易く、線量100Mradより多い場合には感光体特性の劣化が起こり易いので注意が必要である。

【0174】前記正孔輸送性化合物の量は、重合硬化後の保護層膜の全質量に対して、前記一般式(1)で示される連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性基Aの水素付加物が20質量%以上が好ましく、特には40質量%以30上含有されていることが好ましい。20質量%未満であると電荷輸送能が低下し、感度低下及び残留電位の上昇等の問題点が生じ易い。この場合の保護層としての膜厚は0.1~10μmが好ましく、特には0.5~7μmが好ましい。

【0175】次に、感光層について説明する。

【0176】前述の如く、保護層として同一分子内に2つ以上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を使用することで機械的強度は飛躍的に向上するが、感光層が有機系感光層である場合に感度が十分に得られなか40ったり、残留電位の上昇がみられることもあった。また、環境の変化に伴い電位が変動してしまい、十分に安定した電位特性を得られないこともあった。

【0177】本発明者らは鋭意検討した結果、保護層と接する感光層中の電荷輸送材料の分子量と感度、残電、

及び環境電位変動との間に関係があることを見いだし本発明に至った。すなわち、保護層と接する感光層の電荷輸送材料の分子量を350以上にすることで感度の低下、及び残留電位の上昇を抑えることができ、また環境電位変動も抑えることができた。

【0178】本発明のメカニズムは定かではないが以下 のように考えられる。保護層として同一分子内に2つ以 上の連鎖重合性官能基を有する正孔輸送性化合物を、光 及び放射線を照射することによって重合するに際し、保 護層下にある感光層にも光及び放射線は到達している。 この光及び放射線が、感光層中の電荷発生材料及び電荷 輸送材料を劣化させ、感光体特性が低下すると考えられ る。分子量の小さい電荷輸送材料は、吸収した光及び放 射線エネルギーを分散できずに分子の切断による劣化が 生じるが、分子量の大きい電荷輸送材料は吸収した光及 び放射線エネルギーを非局在下させることができ、熱エ ネルギーに変換することで安定化が可能になり劣化が抑 えられると思われる。また、電荷輸送材料が光及び放射 線エネルギーを熱エネルギーに変換させることで、電荷 発生材料の劣化も抑えられると思われる。よって、分子 量の大きい電荷輸送材料を用いた場合、光及び放射線に よる電荷発生材料及び電荷輸送材料の劣化を抑制できる と考えられる。

【0179】本発明においては、電荷輸送材料の分子量が350以上700以下であることが好ましい。700を超えると溶解性が低下するためか、電位特性及び環境変動が悪化する傾向がみられるからである。

【0180】本発明における感光層が含有する電荷輸送材料は、分子量350以上であればいずれのものでもよい。例えば、ポリーNービニルカルバゾール及びポリスチリルアントラセン等の複素環や縮合多環芳香族を有する高分子化合物や、ピラゾリン、イミダゾール、オキサゾール、トリアゾール及びカルバゾール等の複素環化合物、トリフェニルメタン等のトリアリールアルカン誘導体、トリフェニルアミン誘導体、Nーフェニルカルバゾール誘導体、スチルベン誘導体、ヒドラゾン誘導体及びブタジエン誘導体等が挙げられる。

【0181】以下に電荷輸送材料の化合物例とその分子 量を示す。化合物例No.1~No.11は、分子量3 50未満なので本発明外の化合物である。もちろん本発 明に用いられる電荷輸送材料はこれらに限られるもので はない。

[0182]

【化111]

No.	化合物例	分子量
1	○-N-○-○	259.3
2	CH=N-NCH ₉	279.4
3	#c-O-#Q	287.4
4		289.4
5	H ₃ C-CH ₃	301.4
6	C ₂ H ₅ -N-CH=N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	309.5
7	φ-Ο-²Ό-Ο- σμ	329. 5
8	C ₂ H ₅ -N-CH=N-N	343.5
9	\rightarrow \frac{1}{2} \right	346.4
10	0,00	349. 5

[0183]

201	電荷輸送材料の化合物例	2
No.	化合物例	分子鼠
11	~O~O~O	349.5
1 2	والمنظم المنظم ا	353.5
13	8-10-00H 01-00H 01-00H	353.5
14	Charles Control of Con	375.5
15	C2H3-N-CH=N-N	375.5
16	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	377.5
17	H-C ₄ H ₆ N-CH=N-N	387.5
18	Com Com	387.5
19	H ₂ C CH ₃ H ₃ C CH ₃	389. 5
20	HPC-CD-NC-CHE-CD	391.5

[0184] [化113]

電荷輸送材料の化合物例

(103)

No.	化合物例	分子量
2 1	CH-H-Q-OHN-H	393. 5
2 2	N-O-OHEN-N-N	403.5
2 3		403.6
24		404.6
2 5	H ₂ C-CH ₂ OH	405.5
26	HC-Q-N-Q-0-n-C4H6	405.6
27	CHP H*C	416.6
28	cht. N-Q-Q-N-Q	416.6
29	C_2H_5 H_3C C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5	419.6
30	140-O-14-C-O-0	424.0

[0185]

【化114】

電荷輸送材料	の化合物例
--------	-------

205

	単何報之材料の化合物物	
No.	化合物例	分子量
3 1	0-0-0-0 0-0-0-0	425.6
3 2	CHO-CHEN-N	434.5
3 3	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	453.6
3 4	H ₂ C-O-N-O-CH=N-N	453.6
3 5	O+O-O-0+O-0+	463.6
36	HO	455.6
37	0	455.6
38		456.6
39	ON-OH-N-NON-CO	459.6
40		462.7

[0186]

【化115】

	電荷輸送材料の化合物例	
No.	化合物例	分子量
41	O-04-II-O-04-N-I	467.6
42	0-0-0-0	467.6
4 3		468.6
44	H ₂ C N-C>ch+ch-ch=c	479.7
45	ON-CHEN-N	481.4
46	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	481.6
47		481.6
48	S.N-O-CH-S	481.7
4 9	CH () - CH ()	483.7
5 0	H ₃ C H ₃ C·N-②-CH=CH ② CH=C CH=C	491.7

[0187]

【化116】

電荷輸	送材	B 1001	化合	粉何
FE31" 111	22.77	17 2/1	u =	נענס

No.	化合物例	分子量
5 1	C ₂ H ₅ , N-C C ₂ H ₅ , N-C	500.7
5 2	() - CH ₂ N - () - CH= CH- CH=	501.7
53	Carlo N-Carlo Carlo Carl	506.8
54	0+ () - () - (m) - ()	507.7
5.5	H ₃ C	509.7
56	H,C C CH,	5 1 6. 7
5 7	HC CHOOM CHO	516.7
58	HC CHOCH-O-1	5 2 8. 7
59	H ₉ C \\ \rightarrow \rightarr	5 2 9. 7
60	H ₉ C N-CH ₂ -C-N	530.7

[0188]

【化117】

	電荷輸送材料の化合物例				
No.	化合物例	分子量			
61	H ₉ C CI H ₉ C N H ₉ C N H ₉ C CI	531. 5			
6 2	0,00,00	532. 7			
63	C=CH-()-N-()-CH=()	537.7			
64	N-Ch=cCh3	538. 1			
6 5		538. 7			
6 6		540.7			
6 7	0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	543.7			
68	**O**O-O**O-	544. 7			
6 9	H,C \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	548.7			
70	HC-Q-N-Q-CH	5 5 6. 7			

[0189]

【化118】

電荷輸送材料の化合物係	雷荷	輸送	材料	の 们	合!	わき
-------------	----	----	----	------------	----	----

No.	化合物例	分子量
71	CH	557.7
7 2	H.C-(-) 0-CH-(-) - CH-N-1(-)	559.7
7 3		562.7
7 4	NC-(-)-N-(-)-CH	564.7
7 5		572.8
7 6	~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	572.8
7 7	CAMO-()-N-()-OCSH	576.7
78	8-55-8	580.8
79	C=CH()-N()-CHC()	581.8
80	H ₁ CC CH ₂ CH ₃ CH ₃	586.8

[0190]

【化119】

	15 	2
No.	化合物例	分子量
8 1	**************************************	592.8
8 2		598.8
83	*B-0-6	606.8
84	CO+0-0+00	616.8
8 5		620.8
86	O-of-PO-of-O	624.9
87		627.6
88		650.0
8 9		653.9
90	C\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	668.9

[0191]

【化120】

電荷輸送材料の化合物例

217

No.	化合物例	AZE.
140.		分子量
9 1	Huce his constant	683.0
9 2	"0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0	708.7
93	8	716.9
94	05.505.8	727.0
96	0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-0	751.0
96	\$0000\$ \$\frac{1}{\chi}\$	753.0
97	8	828.0
98	C=atatata	858. 1
99	\$\$\partial \partial \par	885. 1

【0192】本発明において、分子量が350以上であ る電荷輸送材料以外の電荷輸送材料を更に添加すること ができる。但し、本発明の効果を十分に得るためには分 子量が350以上である電荷輸送材料が感光層中の全電 荷輸送材料の50質量%以上であることが好ましく、更 に70質量%以上であることがより好ましい。

【0193】本発明の電子写真感光体の構成は、保護層 び電荷輸送材料と結着樹脂を含有する電荷輸送層をこの 順に積層した積層型、また電荷発生材料と電荷輸送材料 と結着樹脂を同一層中に有する単層からなる単層型のい ずれの構成をとることも可能である。

【0194】以下、積層型の感光層について説明する。 【0195】本発明における電荷輸送層は、電荷輸送材 料を結着樹脂と共に溶剤に分散/溶解した溶液を塗布 し、乾燥して形成することができる。

【0196】上記電荷輸送材料と共に用いる結着樹脂と

とができ、例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、 ポリアリレート、ポリメタクリル酸エステル及びポリス チレン等が挙げられる。電荷輸送層の厚さは1~50μ mであることが好ましく、特には5~30μmであると とが好ましい。

【0197】との場合の電荷輸送材料と上記結着樹脂の 比率は、両者の全質量を100とした場合に電荷輸送材 下に感光層として電荷発生材料を含有する電荷発生層及 40 料の質量が10~100が好ましく、好ましくは20~ 100の範囲で適宜選択される。

> 【0198】本発明における電荷発生層は、電荷発生材 料を結着樹脂に分散した溶液を塗布し、乾燥することに よって形成することが好ましいが、電荷発生材料のみを 蒸着することによって形成してもよい。

【0199】電荷発生材料としては、セレンーテルル、 ピリリウム、チアピリリウム系染料、また各種の中心金 属及び結晶系、具体的には例えば α 、 β 、 γ 、 ϵ 及びX型等の結晶型を有するフタロシアニン化合物、アントア しては、従来用いられる電荷輸送層用の樹脂を用いると 50 ントロン顔料、ジベンズビレンキノン顔料、ビラントロ ン顔料、トリスアゾ顔料、ジスアゾ顔料、モノアゾ顔 料、インジゴ顔料、キナクリドン顔料、非対称キノシア ニン顔料、キノシアニン及び特開昭54-143645 号公報に記載のアモルファスシリコン等が挙げられる。 【0200】電荷発生層は、前記電荷発生材料を0.3 ~4倍量の結着樹脂及び溶剤と共にホモジナイザー、超 音波分散、ボールミル、振動ボールミル、サンドミル、 アトライター及びロールミル等の方法で良く分散し、分 散液を塗布し、乾燥されて形成されるか、又は前記電荷 発生材料の蒸着膜等、単独組成の膜として形成される。 その膜厚は5μm以下であることが好ましく、特に0. 1~2μmの範囲であることが好ましい。

219

【0201】結着樹脂を用いる場合の例は、スチレン、 酢酸ビニル、塩化ビニル、アクリル酸エステル、メタク リル酸エステル、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチ レン、等のビニル化合物の重合体及び共重合体、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルアセタール、ポリカーボネ ート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオ キサイド、ポリウレタン、セルロース樹脂、フェノール 樹脂、メラミン樹脂、ケイ素樹脂及びエポキシ樹脂等が 20 挙げられる。

【0202】感光層が単層である場合は、上記電荷発生 材料及び分子量350以上の電荷輸送材料を上記結着樹 脂に分散及び溶解した溶液を塗布し、乾燥することによ って形成することができる。

【0203】本発明における感光層には、各種添加剤を 添加することができる。該添加剤とは、酸化防止剤及び 紫外線吸収剤等の劣化防止剤や、フッ素原子含有樹脂微 粒子等の潤剤その他である。

【0204】電子写真感光体の支持体としては導電性を 30 有するものであればよく、例えばアルミニウム、銅、ク ロム、ニッケル、亜鉛及びステンレス等の金属や合金を ドラム又はシート状に成形したもの、アルミニウム及び 銅等の金属箔をプラスチックフィルムにラミネートした もの、アルミニウム、酸化インジウム及び酸化錫等をブ ラスチックフィルムに蒸着したもの、導電性物質を単独 又は結着樹脂と共に塗布して導電層を設けた金属、また プラスチックフィルム及び紙等が挙げられる。

【0205】本発明においては、導電性支持体表面を化 化学的に処理して不溶性の皮膜を形成してもよい。

【0206】導電性支持体の上には、パリアー機能と接 着機能をもつ下引き層を設けることができる。下引き層 は、感光層の接着性改良、塗工性改良、支持体の保護、 支持体上の欠陥の被覆、支持体からの電荷注入性改良、 また感光層の電気的破壊に対する保護等のために形成さ れる。

【0207】下引き層の材料としては、例えば、ポリエ チレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミ ド樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、フェノール 50 【0214】本発明においては、上述の電子写真感光体

樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ イミド樹脂、塩化ピニリデン樹脂、ポリピニルアセター ル樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニル アルコール樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、アルコール 可溶性ナイロン樹脂、ニトロセルロース、カゼイン、ゼ ラチン、ポリグルタミン酸、澱粉、スターチアセテー ト、アミノ澱粉、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド 等の樹脂、又はシランカップリング剤やジルコニウム、 チタニウム、アルミニウム、マンガン等を含有する有機 10 金属化合物等の金属有機化合物を、単独又は2種以上を 混合して用いることができる。これらは、それぞれに適 した溶剤に溶解されて支持体上に塗布される。その際の 膜厚としては、 $0.1\sim5\mu m$ が好ましい。

【0208】とれら各層の塗布方法としては、例えば、 浸漬コーティング法、スプレーコーティング法、カーテ ンコーティング法及びスピンコーティング法等が知られ ているが、効率性/生産性の点からは浸漬コーティング 法が好ましい。また、蒸着、プラズマその他の公知の製 膜方法が適宜選択できる。

【0209】図1に本発明の電子写真感光体を有するプ ロセスカートリッジを用いた電子写真装置の概略構成を 示す。

【0210】図において、1はドラム状の本発明の電子 写真感光体であり、軸2を中心に矢印方向に所定の周速 度で回転駆動される。電子写真感光体1は、回転過程に おいて、一次帯電手段3によりその周面に正又は負の所 定電位の均一帯電を受け、次いで、スリット露光やレー ザービーム走査露光等の露光手段(不図示)から出力さ れる目的の画像情報の時系列電気デジタル画像信号に対 応して強調変調された露光光4を受ける。こうして電子 写真感光体1の周面に対し、目的の画像情報に対応した 静電潜像が順次形成されていく。

【0211】形成された静電潜像は、次いで現像手段5 によりトナー現像され、不図示の給紙部から電子写真感 光体1と転写手段6との間に電子写真感光体1の回転と 同期して取り出されて給紙された転写材7に、電子写真 感光体1の表面に形成担持されているトナー画像が転写 手段6により順次転写されていく。

【0212】トナー画像の転写を受けた転写材7は、電 成処理すなわち酸又はアルカリ水溶液との反応によって 40 子写真感光体面から分離されて像定着手段8へ導入され て像定着を受けることにより画像形成物(プリント、コ ピー)として装置外へプリントアウトされる。

> 【0213】像転写後の電子写真感光体1の表面は、ク リーニング手段9によって転写残りトナーの除去を受け て清浄面化され、更に前露光手段(不図示)からの前露 光光10により除電処理された後、繰り返し画像形成に 使用される。なお、一次帯電手段3が帯電ローラー等を 用いた接触帯電手段である場合は、前露光は必ずしも必 要ではない。

1、一次帯電手段3、現像手段5及びクリーニング手段9等の構成要素のうち、複数のものを容器11に納めてプロセスカートリッジとして一体に結合して構成し、このプロセスカートリッジを複写機やレーザービームブリンター等の電子写真装置本体に対して着脱自在に構成してもよい。例えば、一次帯電手段3、現像手段5及びクリーニング手段9の少なくとも一つを電子写真感光体1と共に一体に支持してカートリッジ化して、装置本体のレール等の案内手段12を用いて装置本体に着脱自在なプロセスカートリッジとすることができる。

【0215】また、露光光4は、電子写真装置が複写機やプリンターである場合には、原稿からの反射光や透過光、あるいは、センサーで原稿を読取り、信号化し、この信号に従って行われるレーザービームの走査、LEDアレイの駆動及び液晶シャッターアレイの駆動等により照射される光である。

【0216】本発明の電子写真感光体は、電子写真複写機に利用するのみならず、レーザービームプリンター、CRTプリンター、LEDプリンター、FAX、液晶プリンター及びレーザー製版等の電子写真応用分野にも広 20 く用いることができる。

[0217]

【実施例】以下、実施例に従って本発明を更に詳細に説明する。なお、実施例中の「部」は質量部を表す。

【0218】(実施例1)まず導電層用の塗料を以下の 手順で調製した。10質量%の酸化アンチモンを含有す る酸化スズで被覆した導電性酸化チタン粉体50部、フェノール樹脂25部、メチルセロソルブ20部、メタノ* * ール5部及びシリコーンオイル(ポリジメチルシロキサンポリオキシアルキレン共重合体、平均分子量3000)0.002部をφ1mmガラスピーズを用いたサンドミル装置で2時間分散して調製した。この塗料をφ30mmのアルミニウムシリンダー上に浸漬塗布方法で塗布し、140℃で30分間乾燥することによって、膜厚が20μmの導電層を形成した。

【0219】次に、N-メトキシメチル化ナイロン5部をメタノール95部中に溶解し、中間層用塗料を調製し 10た。この塗料を前記の導電層上に浸漬コーティング法によって塗布し、100℃で20分間乾燥することによって、膜厚が0.6μmの中間層を形成した。

【0220】次に、 $CuK\alpha$ の特性X線回折におけるブラッグ角($2\theta\pm0$. 2度)が9. 0度、14. 2度、23. 9度及び27. 1度に強いピークを有するオキシチタニウムフタロシアニンを3部、ポリビニルブチラール(商品名:エスレックBM2、積水化学(株)製)3部及びシクロヘキサノン35部を $\phi1$ mmガラスビーズを用いたサンドミル装置で2時間分散して、その後に酢酸エチル60部を加えて電荷発生層用塗料を調製した。この塗料を前記の中間層の上に浸漬塗布方法で塗布し、50 Cc10 分間乾燥することによって、膜厚が0. 2 μ mの電荷発生層を形成した。

【0221】次いで、電荷輸送材料として化合物例N o.54を10部及び下記構造式(21)の繰り返し単位を有するポリカーボネート樹脂10部を

[0222]

【化121】

$$\begin{array}{c|c}
C & & & \\
H & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C & & \\
0 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C & & \\
0 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C & & \\
\end{array}$$

(Mv = 20000)

モノクロロベンゼン50部/ジクロロメタン30部の混合溶媒中に溶解し、電荷輸送層用塗布液を調製した。この塗布液を前記の電荷発生層上に浸漬コーティングし、110 Cで1時間乾燥することによって、膜厚が 20μ mの電荷輸送層を形成した。

【0223】次いで、化合物例No.6の正孔輸送性化合物60部をモノクロロベンゼン50部/ジクロロメタン50部の混合溶媒中に溶解し保護層用塗料を調製した。この塗料をスプレーコーティング法により、先の電荷輸送層上に塗布し、加速電圧150KV、線量30Mradの条件で電子線を照射し樹脂を硬化することによって、膜厚が5μmの保護層を形成し、電子写真感光体を得た。

【0224】作製した電子写真感光体をキヤノン(株) 製LBP-SXに装着して初期電子写真特性を評価し た。初期の感光体特性 [光減衰感度(暗部電位-700 V設定で-200Vに光減衰させるために必要な光量)及び残留電位Vs1(光減衰感度の光量の3倍の光量を照射したときの電位)]を常温常湿環境下(23℃/5 0%RH)の環境で測定して求めた。その後、環境を高温高湿下(32℃/85%RH)(H/H)に変え、V1の常温常湿環境下からの変動量(△V1)を測定した。結果を表3に示す。

【0225】(実施例2~22及び比較例1~4)実施例1の保護層中の正孔輸送性化合物、あるいは感光層中の電荷輸送材料を表3の様に代えた以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製し、評価した。その結果を表3に示す。

【0226】(実施例23)実施例1の電荷輸送材料の 50 化合物例No.54 10部を化合物例No.198部

及び化合物例No. 54 2部に代えた以外は、実施例 1と同様にして電子写真感光体を作製し、評価した。結 果を表4に示す。

【0227】(実施例24)実施例1の電荷輸送材料の 化合物例No. 54 10部を化合物例No. 53部及 び化合物例No. 54 7部に代えた以外は、実施例1 と同様にして電子写真感光体を作製し、評価した。結果 を表4に示す。

【0228】(実施例25)実施例1の電荷輸送材料の び化合物例No. 54 3部に代えた以外は、実施例1 と同様にして電子写真感光体を作製し、評価した。結果 を表4に示す。

【0229】(実施例26)まず、電子写真用感光体支 持体を以下の手順で得た。 φ30 mmアルミニウムシリ ンダーを用意し、有機りん酸としてフィチン酸及び金属 としてチタニウムを含有するノンクロメート化成処理剤 液(商品名:パルコート3753、日本パーカライジン グ株式会社製)を40℃の温度に保ち、この液中に上 を行った後、純水で洗浄し、自然乾燥させて支持体とし

【0230】上記支持体上に実施例1と同様にして電荷 発生層、電荷輸送層、保護層を形成し、評価した。結果 を表4に示す。

【0231】(実施例27及び28)実施例26の電荷 輸送材料の化合物例No.54を化合物例No.29及 び化合物例No. 68に代えた以外は、実施例26と同 様にして電子写真感光体を作製し、評価した。結果を表 4に示す。

【0232】(実施例29)φ30mmアルミニウムシ リンダーをホーニング処理し、超音波水洗浄したものを 導電性支持体とした。

【0233】次に、メトキシエタノール160部にジル コニウムテトラーnープトキサイドの85%ブタノール 溶液(関東化学社製)64部(0.06m01)及びチ タニウムテトラ-n-ブトキサイド(キシダ化学社製) 22部(0.14mol)を滴下し、メトキシエタノー ル/純水=160部/11部の混合溶液を更に加える。 更に、アセチルアセトン20部をメタノール200部に 40 加えた溶液を滴下した後、ヒドロキシブロビルセルロー

ス(東京化成工業社製)の10質量%メタノール液55 部を混合して得た中間層塗布液をアルミニウムシリンダ ー支持体上に浸漬塗布し、120℃で15分間加熱乾燥 させることによって、膜厚が0.3μmの中間層を形成

【0234】上記中間層上に実施例1と同様にして電荷 発生層、電荷輸送層、保護層を形成し、評価した。結果 を表4に示す。

【0235】(実施例30及び31)実施例29の電荷 化合物例No.54 10部を化合物例No.57部及 10 輸送材料の化合物例No.54を化合物例No.32及 び化合物例No、40に代えた以外は、実施例29と同 様にして電子写真感光体を作製し、評価した。結果を表 4 に示す。

> 【0236】(実施例32)電荷輸送層用塗布液を以下 のように調製した以外は、実施例2と同様にして電子写 真感光体を作製し、評価した。結果を表4に示す。

【0237】電荷輸送材料の化合物例No.54 16 部、前記構造式(21)の繰り返し単位を有するポリカ ーボネート樹脂4部及び酸化防止剤(商品名:イルガノ 記のアルミニウムシリンダーを浸漬し、1分間化成処理 20 ックス1330、チバガイギー社製)1部をモノクロロ ベンゼン50部/ジクロロメタン30部の混合溶媒中に 溶解し、電荷輸送層用塗布液を調製した。

> 【0238】(実施例33)電荷輸送層用塗布液を以下 のように調製した以外は、実施例1と同様にして電子写 真感光体を作製し、評価した。結果を表4に示す。

> 【0239】電荷輸送材料の化合物例No.98 3部 と化合物例No. 89 1部、前記構造式(21)の繰 り返し単位を有するポリカーボネート樹脂16部、酸化 防止剤(商品名:SumilizerGS、住友化学

(株)製)0.5部及び酸化防止剤 (商品名:IRGA FOS-168、日本チバガイギー社製) 0.5部をモ ノクロロベンゼン50部/ジクロロメタン30部の混合 溶媒中に溶解し、電荷輸送層用塗布液を調製した。

【0240】表3及び表4の実施例に示すように、分子 量350以上の電荷輸送材料を用いると電位特性及び環 境特性が良好であるのに対し、比較例に示すように分子 量350未満の電荷輸送材料を用いると感度低下、残留 電位の上昇を生じたものもあったり、また環境変動の大 きなものもあった。

[0241] 【表3】

実施例 1	正孔輸送性化合物 No. 6 10 25	電荷輸送材料 No. 54	駆位 感度 (μJ/cm²) 0.20	Val (-V)	現境変動 △VI (-V)
実施例 1	No. 6 10	No. 54	(μ J/cm³)	(− V)	
1	6	54			(-V)
1	10		0.20	90	
			1	30	14
2	95	54	0.20	32	15
3	20	54	0.23	35	13
4	29	54	0.21	30	14
5	242	54	0.22	33	20
.6	246	54	0.19	31	13
7	249	54	0.22	36	12
8	260	54	0.24	40	23
9	263	54	0.19	32	15
10	266	54	0.20	30	16
11	267	54	0.21	31	15
12	338	54	0.24	43	22
13	415	54	0.25	46	26
14	429	54	0.25	43	25
15	6	19	0.20	50	18
16	6	33	0.24	45	13
17	6	45	0.24	38	16
18	6	56	0.22	34	15
19	6	70	0.22	30	17
20	6	85	0.21	32	25
21	6	92	0.19	30	23
22	6	96	0.20	33	17
比較例	6	2	_	230	64
2	6	4	-	205	54
3	6	7	0.34	136	35
4	6	8	0.31	115	37

[0242] 【表4】

	表 4		
	電位特性		環境変動
1	感度	Vsl	ΔV1
	(μ J/cm²)	(-V)	(-V)
実施例 28	0.19	29	15
24	0.23	38	20
25	0.27	52	37
26	0.21	37	17
27	0.28	43	20
28	0.20	33	17
29	0.20	31	14
30	0.22	40	20
31	0.20	30	15
32	0.18	28	14
33	0.28	45	25

[0243]

【発明の効果】本発明によれば、感度が良好であり、残 留電位の上昇が少なく、環境による電位変動が小さい等 の電子写真特性が非常に良好であり常に安定した性能を 発揮することができる電子写真感光体を提供することが 40 10 前露光光 できた。

【0244】また、上記電子写真感光体の効果は、その

電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子 写真装置においても当然に発揮され、長期間高画質が維 持される。


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電子写真感光体を有するプロセスカー トリッジを用いる電子写真装置の概略構成の例を示す図 である。

30 【符号の説明】

- 1 電子写真感光体
- 2 軸
- 3 帯電手段
- 4 露光光
- 5 現像手段
- 6 転写手段
- 7 転写材
- 8 定着手段
- 9 クリーニング手段
- - 11 プロセスカートリッジ容器
- 12 案内手段

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 丸山 晶夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 雨宮 昇司

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 植松 弘規

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 田中 博幸

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 大地 敦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

Fターム(参考) 2H068 AA02 AA03 AA20 BB04 BB05

BB10 BB14 BB30 BB44 BB52

BB60 FA03